

Jalostuksen tavoiteohjelma

AUSTRALIANKARJAKOIRA

Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa 06.03.2016

Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi]

SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi]



BH EK1 HK2 JK3 VK3 TK1 TK2 TK4 RTK1 RTK2 RTK3 RTK4 Worrigal Copperkalgorlie, "Terra"

Sisällys

1. YHTEENVETO	5
2. RODUN TAUSTA	8
2.1 Alkuperä ja käyttötarkoitus.....	8
2.2 Rodun kehitys nykyiseen muotoonsa	8
2.3 Sukulaisrodut, joiden kanssa yhteinen kehityshistoria.....	11
2.4 Eri linjat	12
2.5 Ensimmäiset koirat Suomessa, koiramäärän kehitys.....	12
3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA	13
3.1. Nykyinen rotua harrastava yhdistys/järjestö ja aiemmat rotujärjestöt	13
3.2. Rotua harrastavan yhdistyksen tai järjestön jäsenmäärä ja sen kehitys	13
3.3. Jalostusorganisaation rakenne ja jalostustoimikunnan tehtävät	14
4. RODUN NYKYTILANNE.....	15
4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja.....	15
4.1.1. Tehollinen populaatiokoko	15
4.1.2. Rekisteröintimäärät Suomessa	18
4.1.3. Tuontikoirien vuosittainen lukumäärä ja jalostuskäyttö	19
4.1.4. Sukusiitos	20
4.1.5. Käytetyimmät jalostuskoirat ja niiden keskinäinen sukulaisuus.....	22
4.1.6. Rodun jalostusurosten ja -narttujen ikä.....	24
4.1.7. Jalostuskoirien käyttömäärät.....	24
4.1.8. Rodun populaatiot muissa maissa	25
4.1.9. Yhteenvedo rodun jalostuspohjan laajuudesta	27
4.1.10. Tärkeimmät jalostuspohjaa kaventavat tekijät.....	27
4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet	28
4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta	28
4.2.2 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa.....	29
4.2.3. Tilanne luonteissa tänä päivänä.....	29
4.2.4. Erot eri maiden populaatioiden välillä.....	30
4.3. Luonnetesti, MH-luonnekuvaus ja australiankarjakoiran käyttö- ja koeominaisuudet.....	30
4.3.1. Luonnetesti	31
4.3.2. MH-kuvaus	34
4.3.3. Käyttö- ja koeominaisuudet	36

4.3.4. Näyttelyt ja jalostustarkastukset	49
4.3.5. Kotikäyttäytyminen ja lisääntyminen	51
4.3.6. Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä niiden korjaamisesta	53
4.4. Terveys ja lisääntyminen.....	55
4.4.1. PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet	55
4.4.2. Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet	64
4.4.3. Yleisimmät kuolinsyyt	77
4.4.4. Lisääntyminen	80
4.4.5. Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä	85
4.5. Ulkomuoto	86
4.5.1. Rotumääritelmä	86
4.5.2. Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus	91
4.5.3. Keskeisimmät ongelmakohdat.....	92
5. YHTEENVETO Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutumisesta.....	93
6. Jalostuksen tavoitteet ja toteutus	95
6.1 Jalostuksen tavoitteet	95
6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille	96
6.3 Rotujärjestön toimenpiteet	97
6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin	98
6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta	99
7. LÄHTEET	100
8. LIITTEET	103

Taulukko 1 TEHOLLINEN POPULAATIOKOKO SUOMESSA 1988-2015.....	17
Taulukko 2 REKISTERÖINNIT 2000-2015	18
Taulukko 3 TUONTIKOIRAT TUONTIMAITTAIN	19
Taulukko 4 KÄYTETYMMÄT TUONTIKOIRAT	19
Taulukko 5 RODUN VUOSITTAINEN SUKUSIITOSASTE 2001-2015	21
Taulukko 6 2005-2015 KÄYTETYMMÄT JALOSTUSUROKSET (REKISTERÖINNIT 2005-2015)	22
Taulukko 7 2005-2015 KÄYTETYMMÄT JALOSTUSNARTUT (REKISTERÖINNIT 2005-2015)	23
Taulukko 8 LUONNETESTATUT AUSTRALIANKARJAKOIRAT SÄÄNTÖVUOSITTAIN	31
Taulukko 9 TESTITULOSTEN JAKAUTUMINEN OSA-ALUEITTAIN	32
Taulukko 10 AUSTRALIANKARJAKOIRIEN HENKISET OMINAISUUDET NYKYTILANNE JA TAVOITE	33
Taulukko 11 LUONNETESTIT 2000-2015.....	34
Taulukko 12 MH-KUVATUT KOIRAT SUOMESSA , KESKIARVOT SUOMI & RUOTSI	35
Taulukko 13 AGILITYSSÄ KILPAILLEET AUSTRALIANKARJAKOIRAT KORKEIMMAN KILPAILULUOKAN MUKAAN	37
Taulukko 14 AGILITYN VUOSITTAISET KILPAILUMÄÄRÄT KILPAILULUOKITTAIN 2000-2015.....	37
Taulukko 15 MENESTYNEIMMÄT AGILITYKOIRAT	38
Taulukko 16 TOTTELEVAISUUSKOKEISSA KILPAILLEET AUSTRALIANKARJAKOIRAT KORKEIMMAN KILPAILULUOKAN MUKAAN	39
Taulukko 17 TOTTELEVAISUUSKOEKÄYNNIT 2000-2015	39
Taulukko 18 MENESTYNEIMMÄT TOKOKOIRAT	40
Taulukko 19 BH-KOEKÄYNNIT 1999-2015	43
Taulukko 20 KOULUTUSTUNNUKSET PALVELUSKOIRAKOELAJEITTAIN	44
Taulukko 21 KOEKÄYNNIT KOELAJEITTAIN 2000-2015	44
Taulukko 22 MENESTYNEIMMÄT PALVELUSKOIRAT	45
Taulukko 23 PELASTUSKOIRAKOEKÄYNNIT 2001-2015	46
Taulukko 24 RALLYTOKON KILPAILUKÄYNNIT JA TULOKSET VUOSINA 2014-2015	48
Taulukko 25 AUSTRALIANKARJAKOIREN LAATUARVOSTELUT 2005-2015	50
Taulukko 26 LONKKANIVELTULOKSET 2005-2015 SYNTYNEISTÄ.....	57
Taulukko 27 LONKKANIVELDYSPLASIAN ARVOSTELUASTEIKKO	58
Taulukko 28 KYNNÄRNIVELDYSPLASIAN ARVOSTELUASTEIKKO.....	61
Taulukko 29 KYNNÄRNIVELTULOKSET SYNTYMÄVUOSI 2005-2015.....	61
Taulukko 30 KAIHIN ESIINTYMINEN SUOMALAISILLA AUSTRALIANKARJAKOIRILLA	64
Taulukko 31 ARVOSTELUSSA KÄYTETTÄVÄ ASTEIKKO (1.6.2013 ALKAEN):	65
Taulukko 32 SPONDYLOOSILAUUNTOJEN VERTAILU RODUITTAIN, SYNTYMÄVUOSI 2000-2015	66
Taulukko 33 SPONDYLOOSILAUUNNOT, SYNTYMÄVUOSI 2005-2015.....	67
Taulukko 34 MUUT RODULLA TODETUT MERKITTÄVÄT SAIRAUDET	68
Taulukko 35 YLEISIMMÄT KUOLINSYYT 1988-2015 (4.11.2015).....	78
Taulukko 36 AUSTRALIANKARJAKOIRIEN KESKIMÄÄRÄINEN PENTUEKOKO SUOMESSA 2005-2015.....	81
Taulukko 37 SYNNYTYKSET VUOSINA 2009-2014.....	83
Taulukko 38 RODUN NÄYTTELYKÄYNNIT 2010-2015.....	91
Taulukko 39 EDELLISEEN TAVOITEOHJELMAAN KIRJATUT JALOSTUSTAVOITTEET SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN	93
Taulukko 40 TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITEOHJELMAN SEURANTA	99
Kaavio 1: REKISTERÖINTIMÄÄRIEN VERTAILU 2003-2013	26
Kaavio 2 LONKKANIVELTULOKSET, LAUSUNTOVUOSI 2000-2015	59
Kaavio 3 KYNNÄRNIVELTULOKSET, LAUSUNTOVUOSI 2000-2015	62
Kaavio 4 KUULOTESTATUT KOIRAT SUOMESSA 2000-2015.....	72
Kaavio 5 SYNNYTYKSET 2009-2014.....	83
Kaavio 6 KEISARINLEIKKAUSTEN SYYT 2009-2014	84
Kaavio 7 PENTUJEN ELINVOIMAISUUS	85

JTO-työryhmässä: Aino Kinnunen, Minkeli Welling, Saira Tiainen

1. YHTEENVETO

Kuvaus rodusta ja sen käyttötarkoituksesta

Australiankarjakoiran kehitys monipuoliseksi työ- ja paimenkoiraksi alkoi 1800-luvulla Australiassa. Australiankarjakoiran käyttötarkoitus oli paimentaa suuria karjalaumoja pitkiä matkoja Australian karuissa oloissa ja suojella sitä varkailta. Rodusta kehittyi rohkea, sitkeä ja älykäs paimenkoira. Nykyään australiankarjakoira on monipuolinen työ- ja harrastuskoira.

Rodun tilanne ja jalostustavoitteet

Australiankarjakoiria käytetään Suomessa monipuolisesti työ- ja harrastuskoirina. Osa rodun yksilöistä elää aktiivisina kotikoirina. Australiankarjakoiria käytetään Suomessa edelleen myös alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan karjapaimenina. Rodun suosio on pienimuotoista, mutta vakaata. Suomalaiset kasvattajat hankkivat ulkomailta tuontikoiria ylläpitämään kannan monimuotoisuutta ja jalostukseen käytettävät koirat ovat pääsääntöisesti kattavasti terveystutkittuja sekä luonnetestattuja. Tärkein jalostustavoite on ylläpitää elinvoimaista, fyysisesti ja psyykkisesti tervettä, monipuoliseen työ- ja harrastuskäyttöön soveltuvaa australiankarjakoirakantaa. Geneettisen monipuolisuuden ylläpito on pienilukuisessa rodussa erittäin tärkeää.

Populaation rakenne ja jalostuspohja

Australiankarjakoirapopulaatio Suomessa on pienilukuinen mutta vakiintunut. Pentueita syntyy vuosittain 5-7 kappaletta ja tämän lisäksi Suomeen rekisteröidään lähes joka vuosi muutamia tuontikoiria. Australiassa ja Amerikassa rotu on suosittu ja rekisteröintimäärät liikkuvat 1200-1400 yksilössä vuosittain. Euroopan maista rotu on erityisen suosittu Saksassa.

Australiankarjakoiran jalostuksessa tulee kiinnittää huomiota elinvoimaisen ja monimuotoisen kannan säilyttämiseen ja yksipuolista jalostuskoirien käyttöä tulee välttää.

Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet

Rotumääritelmä kuvaa australiankarjakoira valppaaksi, äärimmäisen älykkääksi, tarkkaavaiseksi, rohkeaksi, luotettavaksi ja sitkeäksi työkoiraksi. Australiankarjakoira voi olla luonnostaan epäluuloinen vieraita kohtaan, mutta sen tulee mukautua käsittelyyn. Kaikki työkoiralle vieraat luonteenpiirteet ovat rodussa vakavia virheitä. Rotu on omille ihmisilleen uskollinen ja vartiointiviettiäinen.

Jalostuksen tavoitteena tulee olla rodun monipuolisten käyttöominaisuuksien ja työkoiraksi soveltuvan luonteen vaaliminen.

Terveys ja lisääntyminen

Australiankarjakoira kuuluu perinnöllisen vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan lonkka- ja kyynärnivelten kasvuhäiriöiden sekä PRA ja HC –silmäsairauksien osalta. Lisäksi viime vuosina lausutuista virallisista selkäkuvista useilta yksilöiltä on löytynyt hälyttävän paljon spondyloosia. Australiankarjakoirien lisääntymisestä Suomen australiankarjakoirat ry:n jalostustoimikunta teetti kyselyn vuonna 2014. Kyselyn perusteella australiankarjakoirien lisääntymisen huolenaiheena on keisarinleikkauksella syntyneiden pentueiden suuri määrä, 32 prosenttia 2009-2014 syntyneistä pentueista on syntynyt keisarinleikkauksessa. Suurimpana syynä keisarinleikkauksiin on polttoheikkous. Koirien lisääntymishalussa, astumistilanteissa tai pentujen hoidossa ei kyselyn perusteella ole puutteita.

Ulkomuoto

Australiankarjakoiran tulee olla vahva, tiivis ja sopusuhtainen. Rodun rakenteen tulee kestää monipuolista työ- ja harrastuskäyttöä, ja työkoiralle vieraat rakennepiirteet, kuten liiallinen raskaus, puuttuvat kulmaukset tai vaivalloinen liikunta, ovat vakavia virheitä. Suomessa rodun tilanne on hyvä ja rodun kasvattajat ovat sitoutuneet ylläpitämään terveesti liikkuvaa, sopusuhtaista kantaa. Uhkana rodunomaiselle ulkomuodolle ovat liiallisen massan, näyttävyyden tai raskauden tavoittelu näyttelymenestyksen toivossa. Työkoirarodulle tällaiset ulkomuodolliset piirteet ovat ei-toivottavia.

Tärkeimmät suositukset jalostuskoirille

Jalostukseen käytetyn australiankarjakoiran tulee olla luonteeltaan tasapainoinen, terve ja hyväkuntoinen, rotumääritelmän mukainen koira. Jalostuksessa tulee vaalia tervettä rakennetta, rodunomaista luonnetta ja työskentelykykyä sekä ottaa huomioon pienen populaation haasteet jalostuskumppania valitessa. Eri koiria tulisi käyttää jalostuksessa mahdollisimman paljon.

Jalostuskoirien tulisi olla kattavasti tutkittuja ja niiden luonteesta ja/tai työominaisuuksista olisi hyvä olla näyttöä. Pevisa-tutkimusten lisäksi tärkeimpiä tutkimuksia jalostuskoirille ovat BAER-testaus, spondyloositutkimus, polvitutkimus sekä geenitestit pra- ja pll –silmäsairauksia varten.

Jalostukseen käytettävän koiran tulee omata normaali sukupuolivietti. Kykyä luonnonmukaiseen lisääntymiseen ja pentujen hoitoon tulee vaalia, eikä koiraa, joka on jouduttu keisarinleikkaamaan, tule käyttää uudelleen jalostukseen.

Uusintayhdistelmiä ei suositella ja yksittäisellä koiralla ei tulisi olla yli 20 jälkeläistä.

2. RODUN TAUSTA

2.1 Alkuperä ja käyttötarkoitus

Australiankarjakoira kehittyi 1800-luvun alussa Australiassa. Englantilaisten siirtolaisten ja karjankasvatuksen aloittamisen myötä tarvittiin koira, joka kestäisi Australian karuja oloja ja kykenisi fyysisesti ja psyykkisesti vaativaan työhön. Englantilaisia paimenkoirarotuja risteytettiin dingon kanssa, ja eri vaiheiden kautta australiankarjakoira saavutti nykyisen muotonsa. Täyttää yksimielisyyttä rodun kehityksen vaiheista, ja rodun kehitykseen vaikuttaneista roduista ei edes Australiassa ole. Jopa eri rotukerhoilla voi olla eri mielipiteitä ja tietoja karjakoiran kehityksestä.

Yleisimmin australiankarjakoiiriin uskotaan sileäkarvaisen collien ja dingon lisäksi sekoitetun dalmatiankoiraa, 1800-luvun loppupuolen bullterrieri-tyyppisiä koiria. Kokeellisia risteytyksiä tiedetään tehdyn esimerkiksi vinttikoirasekoitusten tai mustaterrierin kanssa, mutta näiden risteyksien jälkeläisten ei uskota vaikuttavan nykymuotoisen australiankarjakoiran kannassa.

2.2 Rodun kehitys nykyiseen muotoonsa

1800-luvulla Australiassa havaittiin, että perinteiset paimenkoirat, joita oli jalostettu englannin oloihin, eivät kyenneet selviytymään kovasta työstä Australian äärimmäisissä olosuhteissa. Tilat olivat valtavia, työvoimaa oli vähän sekä vaikeasti käsiteltävän karjan ajo kaupunkeihin oli erittäin vaativaa. Niinpä ainoa ratkaisu oli kehittää rotu, joka kykenisi kyseiseen työhön.

Australiassa ei ennen siirtolaisten tuloa ollut varsinaisia kesykoiria tai koirarotuja. Ennen eurooppalaisten tuloa mantereelle Australiassa eli punaturkkisia sudenkaltaisia koiria, joita aboriginaalit kesyttivät, käyttivät avuksi metsästykseen ja suojelemaan pendoilta. Dingot, joita aboriginaalit kutsuivat nimellä warrigal, olivat Australian oloihin täydellisesti sopeutuneita, kestäviä, hiljaisia ja älykkäitä koiria. Niiden villikoiramaisuus ja metsästysvietti tekivät hyvän paimenkoiran luomisen kuitenkin hankalaksi, ja siksi australiankarjakoiraa kehittäessä tehtiin hyvin erilaisia risteytyksiä dingojen ja eri rotujen kanssa. Tavoite oli kuitenkin selkeä: kestävä, älykäs, aktiivinen, hiljainen koira, joka kykeni paimentamaan ja suojelemaan suuria karjalaumoja väsymättä. Sen tuli kestää Australian karuja oloja, ja olla peloton, rohkea, älykäs ja ketterä. Lisäksi sen piti puolustaa isäntäväkensä omaisuutta.

Timmin's Biter

Tämä suku on ensimmäisiä karjakoirasukuja Australiassa. Suku syntyi 1830-luvun tietämillä, kun karjanajaja Timmins risteytti smithfield-koiria dingon kanssa. Englantilainen Smithfield oli hännätön, paksuturkkinen, luppakorvainen, väriltään musta valkoisella merkillä, joka alkoi päästä leviten alas etuosaan. Se oli kömpelö koira, joka haukkui liikaa ja kärsi kuumuudesta. Risteytyksillä villikoira dingon kanssa saatiin aikaan kestävämpiä, ketterämpiä koiria, jotka työskentelivät hiljaa ja olivat kovia kinnertämään. Niiden suurin vika oli karjan liiallinen pureminen ja saalistaminen. Dingon saalistusominaisuudet olivat niissä hyvin vahvoja ja koska ne herkästi raatelivat karjaa mikäli paimen jätti ne yksin, suurin osa Timminsin purijoista kuoli sukupuuttoon. Seuraavat risteytykset tehtiinkin pitkäkarvaisten collieiden kanssa.

Hallin heeler

Thomas Hall toi noin 1840 kaksi lyhytkarvaista blue merle collieta Hunter Valleyhyn New Shout Walesiin. Ne olivat kohtuullisia paimenkoiria, mutta pyrkivät kiertämään karjan eteen. Collie-risteytyksiä (pitkäkarvaisia) oli kokeiltu ennenkin, mutta lyhytkarvaisten collieiden kanssa tehdyt risteytykset olivat onnistuneempia. Ne olivat kestäviä, kykenivät kulkemaan tuhansia mailleja ja paimensivat dingon tyylillä; hiipivät hiljaa karjan taakse ja purivat ja näykkivät karjaa takajaloista, liikutellakseen niitä. Ne olivat ketteriä ja painautuivat vaistomaisesti maata vasten estääkseen karjan potkujen osumisen. Koirat olivat väriltään sinisiä tai punaisia. Hall'n heelerit olivat laajasti tunnettuja karjanajajien ja kasvattajien keskuudessa ja Sydneyssä niitä pidettiin parhaimpina paimenkoirina. Thomas Hall jatkoi rodun kehittämistä 30 vuotta kuolemaansa asti.

1870-luvulla Thomas Hallin kuoltua useat kasvattajat jatkoivat australiankarjakoiran kehittämistä. Yksi kuuluisimmista oli Tom Bentley, jonka koirat olivat Thomas Hallin jalostustyön peruja. Tom Bentleyyn koirien jälkeläisistä aloittivat useat eri karjakoirakasvattajat kasvatustyönsä. Rodun otsan valkoisia karvoja kutsutaan "Bentleyn tähdiksi", ja sitä pidettiin merkinä siitä, että australiankarjakoira oli aitoa alkuperää ja Thomas Hallin ja Tom Bentleyyn erinomaisten työkoirien jälkeläisiä.

Bagustin veljekset ja kelpieristeytykset

Jack ja Harry Bagust halusivat kehittää Hallin heelereitä vielä pidemmälle, ja risteyttivät niitä valikoitujen dalmatiankoirien kanssa saadakseen koirista hevosystävällisempiä ja parantaakseen niiden vartiointiominaisuuksia. Karjakoiran värin uskotaan tässä vaiheessa muuttuneen täplikkäästä (mottled) kirjavaksi (speckled). Parantaakseen työskentelyominaisuuksia Bagustit yhdistivät koiriinsa vielä merkkivärisiä kelpieitä parantaakseen koirien hallittavuutta ja paimennusominaisuuksia.

Robert Kaleski ja australiankarjakoiran ensimmäinen rotumääritelmä

Robert Kaleski oli itseoppinut kirjailija, metsästäjä, ympäristötieteilijä ja koira-asiantuntija, joka jatkoi Thomas Hallin koirien kasvattamista. Hän kasvatti koiria omaan työkäyttöön ja lisäksi näyttelytti niitä ahkerasti. Kaleski perusti Australin paimen- ja karjakoirayhdistyksen sekä kirjoitti useita koira-aiheisia julkaisuja. Australiankarjakoirien lisäksi hän oli kiinnostunut australiankelpieistä ja kirjoitti myös kelpieiden ensimmäisen rotumääritelmän.

Robert Kaleskin kirjoittaman ja kuvittaman ensimmäisen rotumääritelmän hyväksyi Cattle and Sheepdog Club of Australia 1903. Australian National Kennel Council hyväksyi rotumääritelmän virallisesti 1963. FCI hyväksyi rotumääritelmän 18.11.1985. Suomen Kennelliitto hyväksyi rotumääritelmän suomenkielisen käännöksen 8.3.1989.

The McNiven Dogs ja uudelleenristeytykset dingon kanssa

1940-luvulla australialainen eläinlääkäri Allan McNiven huolestui australiankarjakoirien psyykkisestä ja fyysisestä heikkenemisestä ja päätti uudelleenristeyttää australiankarjakoiria dingon kanssa. Näitä risteytyksiä vietiin runsaasti Amerikkaan työkoiriksi. Kun Royal Agricultural Society Kennel Council sai tietää villikoiraristeytyksistä, kiellettiin McNiveniä osallistumasta koiranäyttelyihin ja hänen jalostamansa koirat poistettiin rekisteristä. Niiden jälkeläisiä silti uskotaan edelleen olevan Amerikassa, vaikka ne ja muut ”epämääräistä alkuperää” olevat koirat pyrittiin visusti erottamaan virallisista rekistereistä.

Australiankarjakoiran nykytilanne Australiassa

Australiankarjakoira on vuonna 2014 Australian 12. eniten rekisteröity koirarotu. Paimenkoiraryhmästä se on kolmanneksi suosituin rotu heti saksanpaimenkoirien (3584 rekisteröityä koira) ja bordercollien (2697 rekisteröityä koira) jälkeen. Vuonna 2014 australiankarjakoiria rekisteröitiin Australiassa 1221 kappaletta.

Australiankarjakoiria harrastavia yhdistyksiä on Australiassa 4 kappaletta, ne jakautuvat alueittain. Eri kasvattajat kannattavat eri yhdistyksiä ja listautuvat niiden jäseniksi. Yhdistykset eivät tee keskenään paljoakaan yhteistyötä vaan ovat eri kasvattajien ympärille keskittyneitä yhdistyksiä. Varsinaista alkuperämaan rotuyhdistystä ei täten rodulla ole.

Terveystutkimukset eivät ole Australiassa yleisiä eivätkä jalostuskoirille pakollisia. Tyypillisimmin jalostuskoirat testataan kuurouden ja PRA:n osalta. Luuston kuvaaminen ei ole yleistä. Rekisteröityjen australiankarjakoirien terveystuloksia ei ole koottu samaan tapaan kuin esimerkiksi suomalaisen jalostustietojärjestelmään. Merkittävimpinä australiankarjakoirien terveyteen liittyvinä tutkimuksina voidaan pitää 2011 valmistunutta populaation tehollisen koon tutkimusta ja 2012 valmistunutta tutkimusta australiankarjakoirien väriin liittyvästä kuuroudesta.

2.3 Sukulaisrodut, joiden kanssa yhteinen kehityshistoria

Australiankarjakoiran merkittävin sukulaisrotu on Suomessa erittäin harvinainen australian töpöhäntäinen karjakoira. Töpöhäntäisen karjakoiran ja australiankarjakoiran eriytyminen eri roduikseen on alkanut 1830-luvulla, Timmins biter –karjakoirat muodostavat töpöhäntäisen karjakoiran esi-isän ja niiden töpöhäntäisyys juontaa juurensa hännättömiin Smithfieldin koiriin.

Australiankelpiä pidetään australiankarjakoirien sukulaisrotuna. Rodut kehittyivät samoista syistä, samoissa oloissa, mutta australiankelpiä jalostettiin ensisijaisesti lammaskoiriksi, kun taas australiankarjakoira nautapaimeniksi. Rekisteröimättömässä australialaisessa työkoirakannassa risteytyksiä tehdään tänäkin päivänä koirien työominaisuuksiin, ei rotupuhtauteen, perustuen.

2.4 Eri linjat

Australiankarjakoirissa ei ole eroteltavissa selkeästi eri linjoja. Rotu ei ole jakautunut työ- tai näyttelylinjaan ja maailmanlaajuisesti koirat ovat alkuperältään hyvin samoista koirista lähtöisin. Australiassa ja Amerikassa rekisteröintikäytännöt ovat erilaisia ja kasvattajat jotka kasvattavat puhtaasti työhön kykeneviä koiria, eivät useinkaan rekisteröi koiriaan. Näiden koirien rotupuhtaudesta ei myöskään ole täyttä varmuutta. Rekisteröinnin pääsyynä etenkin Australiassa on mahdollisuus näyttelyttää koiria – muut koiraharrastukset eivät vaadi maassa rekisteröintiä. Australian National Kennel Council arvioi että vain 25% syntyneistä koirista kaikissa roduissa rekisteröidään.

2.5 Ensimmäiset koirat Suomessa, koiramäärän kehitys

Ensimmäisen australiankarjakoiran toi Suomeen Paula Rieki vuonna 1984 Ligras kennelistä Ruotsista ja ensimmäinen pentue syntyi Paula Riekin Cranefield's kenneliin 1985. Ligras Blue Konnie ja Ligras Blue Aberdeen olivat ensimmäisen Suomessa syntyneen australiankarjakoira-pentueen vanhemmat. Alussa koiria tuotiin pääsääntöisesti Ruotsista lisää ja niillä tehtiin erittäin ahtaitakin sisäsiitoksia. Myöhemmin koiria tuotiin myös Australiasta, Kanadasta, Saksasta ja USA:sta, mikä levensi huomattavasti jalostuspohjaa ja antoi mahdollisuuden ulkosiitospentueille.

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA

3.1. Nykyinen rotua harrastava yhdistys/järjestö ja aiemmat rotujärjestöt

Suomen Australiankarjakoirat ry:n perustava kokous pidettiin 29.10.1988 ja yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 8.9.1989. Suomen Australiankarjakoirat ry toimii Suomen Kennelliiton ja Suomen Palveluskoiraliiton alaisena rotua harrastavana yhdistyksenä. Yhdistystä perustamassa olivat palveluskoiratoiminnasta kiinnostuneet ihmiset ja yhdistyksen perustamisen ensisijaisena tarkoituksena oli saada rodulle osallistumisoikeus palveluskoirakokeisiin ja kehittää rotua paimen- ja palveluskoirana.

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää ja ylläpitää puhdasrotuisten australiankarjakoirien kasvattamista, jalostusta ja kouluttamista monipuolisena palvelus-, paimen- ja harrastuskoirana. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa seuraamalla rodun kehitystä ja tekemällä rotua koskevia aloitteita, kirjaamalla ja julkaisemalla terveys-, koe- ja näyttelytuloksia, järjestämällä kokeita ja luonnetestejä. Rodun harrastajille ja arvostelutuomareille järjestetään koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, julkaistaan tiedotuskanavana jäsenistölle Karjis-lehteä, harrastetaan yleensä koulutusta edistävää toimintaa sekä rodun jalostamista.

3.2. Rotua harrastavan yhdistyksen tai järjestön jäsenmäärä ja sen kehitys

Rotua harrastavan yhdistyksen jäsenmäärä on vaihdellut muutamasta kymmenestä reiluun sataan jäseneen. Rotua harrastava yhdistys on jäsenmäärältään pienilukuinen mutta kohtuullisen vakaa. 2015 jäsenmäärät jakautuivat seuraavasti:

- vuosijäseniä 62
- perhejäseniä 6
- ainaisjäseniä 13
- kunniajäseniä 1
- tutustumisjäseniä 2

Yhteensä 84 jäsentä.

3.3. Jalostusorganisaation rakenne ja jalostustoimikunnan tehtävät

Yhdistyksen hallitus nimittää vuosikokouksessa jalostustoimikunnan vuodeksi kerrallaan. Jalostustoimikunnassa toimii 3-5 henkilöä, joista yksi toimii jalostustoimikunnan puheenjohtajana. Jäsenistöllä on vuosikokouksessa mahdollisuus esittää henkilöitä jalostustoimikuntaan. Jalostustoimikunnan tulisi ensisijaisesti muodostua rodun kasvattajista. Jalostustoimikunnan jäsenellä tulee olla riittävä perinnöllisyystieteiden osaaminen, kyky toimia puolueettomasti, diplomaattisesti ja avoimesti toimikunnassa.

Jalostustoimikunnan toimintaa ohjaa jalostustoimikunnan toimintaohje, joka on vahvistettu vuosikokouksessa 18.3.2000, toimintaohjeen mukaan jalostustoimikunta valvoo ja ohjaa australiankarjakoirien jalostusta. Jalostustoimikunnan tehtävänä on toimia neuvoa-antavana elimenä yhdistyksen jäsenille, kerätä jalostuksen kannalta merkittävää tietoa ja jakaa tietoa jäsenistölle.

Jalostustoimikunta toimii hallituksen alaisuudessa ja jalostustoimikunnan kokouspöytäkirjat lähetetään hallitukselle. Vuoden lopussa jalostustoimikunta laatii toimintakertomuksen ja tekee toimintasuunnitelman seuraavalle vuodelle. Jalostustoimikunta vastaa jalostuksen tavoiteohjelman tekemisestä, ja pyytää tarvittaessa ulkopuolista osaamista jalostuksen tavoiteohjelman tekoon. Lisäksi jalostustoimikunta ylläpitää terveystietoa ja luonnetestitulastoja.

4. RODUN NYKYTILANNE

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja

Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geenimuotojen (alleelien) runsautta. Puhutaan myös jalostuspohjan laajuudesta.

Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita sillä on olemassa samasta geenistä. Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygotiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa ja suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää myös immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus ja perinnöllinen edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä on perinnöllistä vaihtelua.

Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun koirista ja sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään nähden liian suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät haitalliset mutaatioalleelinsa vähitellen koko rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä mutaatiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -sairaus. Vähitellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä mutaatiota ole.

Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään koiria tasaisesti rodun kaikista sukulinjoista. Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa roduissa enintään 5 % ja suurilukuisissa enintään 2-3 % laskettuna rodun neljän vuoden rekisteröintimäärästä. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana yhteensä 1000 koiraa, ei yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20-50 koiralle. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % laskettuna neljän vuoden rekisteröinneistä.

4.1.1. Tehollinen populaatiokoko

Mitä suurempi rodun tehollinen populaatiokoko on, sitä paremmin perinnöllinen vaihtelu säilyy rodussa. Pieni tehollinen koko tarkoittaa nopeaa sukusiitoksen lisääntymistä.

Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä monimuotoisuudesta.

Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että tehollinen populaatiokoko kertoo kuinka monen yksilön geenimuotoja tietyssä rodussa tai kannassa on. Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun sukusiitosaste kasvaa yhtä nopeasti kuin jos rodussa olisi 50 tasaisesti jalostukseen käytettyä koiraa. Mitä pienempi tehollinen koko on, sitä nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa ja perinnöllinen vaihtelu vähenee. Samalla sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu.

Kun tehollista kokoa arvioidaan jalostuskoirien lukumääristä tai rekisteriaineistojen sukutauluista, laskelmat tehdään aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla kolmesta neljään ja käyttökoirilla viisi vuotta. Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enintään neljä kertaa tänä aikana jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten urosten lukumäärä.

Jalostuskoirien lukumäärän perusteella laskettu tehollinen koko on aina yliarvio, koska kaava olettaa, etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. Parempi tapa arvioida tehollista populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen, mutta tämä kaava toimii vain suljetulle populaatiolle ja aineistolle, jossa sukupuut ovat hyvin pitkiä. Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä Koiranetissä käytettävää jalostuskoirien lukumääriin perustuvaa laskentakaavaa on hieman muokattu, jotta se huomioisi paremmin jalostuskoirien epätasaiset jälkeläismäärät. Jalostustietojärjestelmässä käytetään kaavaa $Ne = 4 \cdot Nu \cdot Nn / (2 \cdot Nu + Nn)$, jossa

- Nu on neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusurosten ja
- Nn neljän vuoden aikana käytössä olleiden eri jalostusnarttujen lukumäärä.

Tehollista kokoa voidaan arvioida myös rodun koirista otettujen dna-näytteiden avulla.

Paras tapa säilyttää perinnöllistä vaihtelua ja estää perinnöllisten sairauksien kasaantuminen on välttää yksittäisen yksilön runsasta jalostuskäyttöä.

Jos rodun tehollinen koko on alle 50 - 100, rodusta häviää geenimuotoja niin nopeasti, ettei luonto pysty tasapainottamaan tilannetta. Silloin on keskityttävä säilyttämään mahdollisimman monen yksilön geenejä käyttämällä mahdollisimman useaa eri koiraa jalostukseen ja huolehtimalla, että niiden jälkeläismäärät pysyvät tasaisina. Toisaalta suurimmalla osalla roduistamme on kantoja myös ulkomailla, jolloin voi olla mahdollista tuoda maahamme ”uutta verta”. Monella rodulla ulkomailta ei kuitenkaan ole saatavissa sen erilaisempaa geenimateriaalia kuin kotimaastakaan.

Australiankarjakoirien maailmanlaajuista tehollista populaatiokokoa ei ole tutkittu kattavasti eikä

rodun geneettiseen monipuolisuuteen ole kiinnitetty paljonkaan huomiota. Rodun valtamaissa Australiassa ja Amerikassa matadoriuroksia ja uusintayhdistelmiä käytetään laajasti kun taas pienemmissä maissa jalostusyksilöitä on niin vähän, että vaihtoehtoja monipuoliseen koirien käyttöön ei ole ollut. Nykyään tuontikoirien tuominen, pakastesperman käyttö ja tieto geneettisestä monipuolisuudesta ja sen tärkeydestä ovat kuitenkin yleistyneet. Menneet jalostusvalinnat ja alun pitäenkin harvoista jalostuskoirista rakentunut rotu tuovat haasteita rodun geneettisen monipuolisuuden ylläpitoon.

Suomessa australiankarjakoirien tehollista populaatiokokoa voidaan tarkastella joko vuosittain tai sukupolvittain.

Taulukko 1 TEHOLLINEN POPULAATIOKOKO SUOMESSA 1988-2015

	Vuosittain	Sukupolvittain
2015	5	22
2014	4	23
2013	7	31
2012	10	33
2011	9	31
2010	11	29
2009	9	28
2008	11	32
2007	9	33
2006	8	34
2005	10	36
2004	13	34
2003	9	29
2002	14	32
2001	7	30
2000	12	34
1999	14	33
1998	7	27
1997	12	30
1996	10	27
1995	7	25
1994	12	29
1993	7	24
1992	7	21
1991	12	16
1990	5	9
1989	4	6
1989	5	5
keskiarvo	8,9	26,5

Suomalaisten australiankarjakoirien tehollinen populaatiokoko on erittäin pieni. Jalostuskäyttö kasaantuu vain harvoille koirille ja nekin voivat olla sukua toisilleen. Jalostuksessa geneettistä monipuolisuutta tulee vaalia ja jalostuskoiria tulisi käyttää monipuolisesti. Koska pentuja syntyy niin vähän, ei kannasta saada käyttöön kuin hyvin rajallinen määrä koiria jalostukseen.

Britanniassa vuonna 2014 Kennel Clubin teettämän tutkimuksen mukaan Britannian australiankarjakoirakannan tehollinen populaatiokoko 1980-2005 olisi keskimäärin 23,6. Arvioitu sukusiitosasteen kehitykseen perustuva tehollinen populaatiokoko on tutkimuksen mukaan 134. Tutkimuksessa huomioitiin, että Britannian kannan sukusiitosaste on korkea, mutta koirien sukusiitosprosentti on kuitenkin laskenut ajan myötä, jonka takia arvion mukaan geneettinen monipuolisuus olisi kasvanut. Puuttellinen tieto tuontikoirien keskinäisistä sukulaisuussuhteista vaikuttaa myös korkeaan arvioon.

Kaikista kattavin australiankarjakoiran tehollista populaatiokokoa koskeva tutkimus tehtiin Australiassa 2006. Aineisto käsitti rekisteröidyt australiankarjakoirat vuodesta 1954, yhteensä 74 290 koiraa. Australian populaation tehollinen populaatikoko on 57.

Australiankarjakoira kuuluu rotuihin joiden geneettiseen monipuolisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jalostuskoiria tulee käyttää monipuolisesti ja jalostukseen käytettävien koirien jälkeläismäärien tulee pysyä kohtuullisina.

4.1.2. Rekisteröintimäärät Suomessa

Taulukko 2 REKISTERÖINNIT 2000-2015

Vuosi	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	yhteensä
Pennut	21	14	22	35	26	31	31	33	28	31	38	43	38	43	20	41	495
Tuonnit	4	5	5	0	4	5	3	8	6	1	2	1	0	7	3	2	56
Yhteensä	25	19	27	35	30	36	34	41	34	32	40	44	38	50	23	43	551

Australiankarjakoirien vuosittaiset rekisteröintimäärät ovat kohtuullisen alhaisia, rekisteröintien keskiarvo on 34,4 koiraa vuodessa. Pentujen kysyntä vastaa hyvin syntyvien pentujen määrää ja aktiiviset kasvattajat ja harrastajat tuovat ulkomailta myös uutta verta.

4.1.3. Tuontikoirien vuosittainen lukumäärä ja jalostuskäyttö

2000-2015 rekisteröidyistä koirista 10% on tuontikoiria. Yhteensä tuontikoiria rodussa on 99 koiraa.

Yleisimmät tuontimaat ovat Australia ja Ruotsi.

Taulukko 3 TUONTIKOIRAT TUONTIMAITTAIN

Tuontimaa	Tuotuja koiria
Australia	29
Ruotsi	25
Viro	15
Saksa	8
Yhdysvallat	7
Kanada	6
Tsekki	4
Alankomaat	1
Belgia	1
Italia	1
Liettua	1
Puola	1
YHTEENSÄ	99

Tuontikoirilla on Suomessa yhteensä 129 pentuetta. Näistä 38 pentuetta kuuluu viidelle käytetyimmälle tuontiuokselle. Ulkomailla useita pentueita tehneiden urosten merkitys Suomen kannassa korostuu, sillä niiden jälkeläisiä löytyy usein myös tuontikoirien sukutaulusta. Keskenään nämä tuontikoirat eivät ole läheistä sukua.

Taulukko 4 KÄYTETYIMMÄT TUONTIKOIRAT

Nimi	S. vuosi	Tuontimaa	Pentueet Suomessa	Pentueet ulkomailla*	Jälkeläisiä
Ligras Red Dompierre	1986	Ruotsi	10	0	56
Kurpa's Jump Back Jack	1994	Yhdysvallat	8	5	28
Ligras Blue Mascot of Sweden	1990	Ruotsi	7	0	39
Reddenblu's Gunpowder	1998	Kanada	7	5	42
Adavale Red Revenge	1993	Australia	6	6	27

*ACD pedigree Finderiin ilmoitetut pentueet

4.1.4. Sukusiitos

Sukusiitoksessa pentueen vanhempina käytettävät koirat ovat keskenään sukua. Sukusiitoksena pidetään serkusten tai sitä läheisempien sukulaisten yhdistämistä. Sukusiitos kasvattaa riskiä perinnöllisten sairauksien esilletuloon.

Sukusiitosaste tai -prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valittu geenipari sisältää geenistä kaksi samaa alleelia (versiota), jotka ovat molemmat peräisin samalta esivanhemmalta. Saman esivanhemman tietty alleeli on siis tullut koiralle sekä isän että emän kautta. Tällainen geenipari on homotsygoottinen ja identtinen. Ilman sukusiitosta suurin osa yksilöiden geenipareista on heterotsygoottisia, jolloin haitalliset, usein resessiiviset alleelit pysyvät vallitsevan, normaalin alleelin peittäminä.

Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Isä-tytär -parituksessa jälkeläisten sukusiitosaste on 25 %, puolisisarparituksessa 12,5 % ja serkusparituksessa 6,25 %.

Sukusiitos vähentää heterotsygoottisten geeniparien osuutta jokaisessa sukupolvessa sukusiitosasteen verran, joten esimerkiksi puolisisarparituksessa jälkeläisten heterotsygotia vähenee 12,5 %. Myös todennäköisyys haitallisten resessiivisten ongelmien esiintuloon on puolisisarparituksessa 12,5 %.

Koirilla on rotuja muodostettaessa käytetty runsaasti sukusiitosta. Sukusiitoksella pyritään tuottamaan tasalaatuisia ja periyttämisvarmoja eläimiä. Jos huonot alleelit esiintyvät kaksinkertaisina sukusiitoksen ansiosta, niin mikseivät hyvätkin. Toisaalta sukusiitettykin eläin siirtää vain puolet perimästään jälkeläisilleen, jolloin edulliset homotsygoottiset alleeliyhdistelmät purkautuvat. Lisäksi jokainen yksilö kantaa perimässään useita haitallisia alleleja, joiden todennäköisyys tulla esiin jälkeläisissä kasvaa sukusiitoksen myötä, joten turvallisia sukusiitosyhdistelmiä ei ole.

Tutkimuksissa on todettu sukusiitoksen haittavaikutusten alkavan näkyä eläimen sukusiitosasteen ylittäessä 10 %. Silloin todennäköisyys hedelmällisyyden ja elinvoiman heikkenemiseen kasvaa, ja nähdään esimerkiksi lisääntymisvaikeuksia, pentukuolleisuuden nousua, pentujen epämuodostumia, vastustuskyvyn heikkenemistä sekä tulehdusalttiutta. Ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. Jos sukusiitosaste kasvaa hitaasti monen sukupolven aikana, haitat ovat pienemmät kuin nopeassa sukusiitoksessa eli lähisukulaisten yhdistämisessä.

Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellaisia sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu täsmälleen samalla

sukupolvimäärällä. Jalostuksessa suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %.

Rodun vuosittainen sukusiitosaste

Taulukko 5 RODUN VUOSITTAINEN SUKUSIITOSASTE 2001-2015

2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
0,00%	0,70%	0,40%	2,85%	2,98%	0,6%	3,97%	2,31%	2,63%	6,53%	7,54%	5,96%	5,39%	6,96%	4,35%

Vuosittainen sukusiitosaste ennen 2000-lukua oli pahimmillaan 23,35% ja useina vuosina reilusti yli 10%. Rodun vuosittainen sukusiitosaste lähti jyrkästi laskemaan vasta vuosien 2005 ja 2006 jälkeen. Yhtenä merkittävimpänä syynä sukusiitoksen välttämiseen voidaan pitää Suomessa esiintyneitä NCL-sairaita koiria. Sairauden uskotaan periytyvän resessiivisesti, ja yhdistelmissä, joissa sukusiitoskerroin on korkea, sairauden ilmeneminen on todennäköisempää. Sairauden esiintyminen suomalaisessa australiankarjakoirakannassa vaati toimia sukusiitosasteen vähentämiseksi. Suomalaiset australiankarjakoirakasvattajat ovat toimineet vastuullisesti rodun monipuolisuutta ja terveyttä ylläpitääkseen.

4.1.5. Käytetyimmät jalostuskoirat ja niiden keskinäinen sukulaisuus

Taulukko 6 2005-2015 KÄYTETYIHMÄT JALOSTUSUROKSET (REKISTERÖINNIT 2005-2015)

*Koiran kaikki rekisteröidyt pennut mukaanlaskettuna pentueet ennen vuotta 2005

	Uros	s.vuosi	Alkuperä	Pentueet	Pennut	%osuus	Kumulat.%	Pentueita 2. polvi	Pentuja 2. polvi	Pennut yhteensä *
1	Jayblue Aussie Salute	2008	Australia	3	19	6,13%	6%	3	16	19
2	Iznogood Rock Da Taliho	2007	Suomi	5	17	5,48%	12%	1	1	17
3	Windwarrior's Dream Catcher	2011	Suomi	2	15	4,84%	16%	0	0	15
4	Windwarrior's Masterhood	2003	Suomi	4	15	4,84%	21%	1	5	15
5	Snjos Blue Flaming Arrow	2009	Ruotsi	3	13	4,19%	25%	0	0	13
6	Mystar Special Edition	2006	Australia	4	13	4,19%	30%	2	4	13
7	Cattlefarm's Soul Brother	2003	Suomi	2	12	3,87%	34%	1	3	12
8	Sweet Azur's Chico	2006	Tanska	2	11	3,55%	37%	4	9	11
9	Cattlepark's Mouldtail	1999	Suomi	2	8	2,58%	40%	1	8	9
10	Lebensberuf Mutvoll Möksy	2001	Suomi	2	8	2,58%	42%	1	5	8
11	Dalaussie's Snowman	2004	Kanada	3	8	2,58%	45%	4	10	8
12	Iznogood Pop Da Taliho	2007	Suomi	2	8	2,58%	47%	1	5	8
13	Willacarras Blue Aramut	2004	Norja	1	8	2,58%	50%	1	4	8
14	PK Hovikosken Atlanmonto	2007	Suomi	3	8	2,58%	53%	1	4	8
15	Cossaks Perhaps Perfekt	1999	Suomi	1	8	2,58%	55%	0	0	11
16	Lebensberuf Nett Neperi	2003	Suomi	1	7	2,26%	57%	6	24	7
17	Doc Bar Cidabro	2003	Tsekki	1	7	2,26%	60%	6	29	7
18	Inglisilm Charming Clown	2002	Viro	1	7	2,26%	62%	0	0	6
19	Bdobre-Bob	2007	Ruotsi	1	6	1,94%	64%	1	4	6
20	Cossaks Yarrawah Zephyr	2008	Suomi	2	6	1,94	66%	0	0	6

13 urosta on käytetty tuottamaan 50% ajanjakson pennuista.

Jalostukseen käytettävillä uroksilla on merkittäviä keskinäisiä sukulaisuussuhteita:

- Kaikista käytetyin koira, Jayblue Aussie Salute on 3. eniten käytetyn Windwarrior's Dream Catcherin isä, yhdessä isän ja pojan jälkeläiset kattavat 11,0% ajanjakson aikana syntyneistä koirista.
- 2. Käytetyimmän koiran Iznogood Rock Da Talihon on täysveli 12. käytetyimmän koiran Iznogood Pop Da Talihon kanssa, yhdessä veljesten jälkeläiset kattavat 8,1% ajanjakson aikana

syntyneistä koirista.

- 11. käytetyin koira, Dalaussie's Snowman on 14. käytetyimmän PK Hovikosken Atlanmonton isä, yhdessä näiden koirien jälkeläiset kattavat 5,2% tuotetuista koirista
- 15. käytetyimmän koiran, Cossaks Perhaps Perfektin emä, on 16. käytetyimmän koiran Lebensberuf Nett Neperin emänemä.

Jalostukseen käytetyillä uroksilla on näiden mainittujen muita, kauempana sukutaulussa esiintyviä yhteisiä esivanhempia.

Taulukko 7 2005-2015 KÄYTETYIMMÄT JALOSTUSNARTUT (REKISTERÖINNIT 2005-2015)

*Koiran kaikki rekisteröidyt pennut mukaanlaskettuna pentueet ennen vuotta 2005

	Narttu	s.vuosi	Alkuperä	Pentueet	Pennut	%osuus	Kumulat.%	Pentueita 2. polvi	Pentuja 2. polvi	Pennut yhteensä *
1	Lebensberuf Zirkon Zidane	2004	Suomi	4	17	5,48%	6%	2	8	17
2	Windwarrior's Unbreakable Blue Ice	2009	Suomi	3	16	5,16%	11%	1	7	16
3	Cattlefarm's Blue Hannah	2002	Suomi	3	14	4,52%	15%	2	6	14
4	Cossaks Unique Beauty	2004	Suomi	3	13	4,19%	19%	5	14	13
5	Karjapeni Cena	2005	Suomi	3	11	3,55%	23%	1	4	11
6	Zoominblu Prima	2010	Australia	3	11	3,55%	27%	1	1	11
7	Illinois Kazari Toyo-Ken	2012	Tsekki	1	9	2,90%	29%	0	0	9
8	Lebensberuf Nonnplusultra	2003	Suomi	1	9	2,90%	32%	1	3	9
9	Cor Hydrae Astra Canina	2001	Puola	2	9	2,90%	35%	1	6	9
10	Cossaks Ninna-Mincka	1998	Suomi	1	8	2,58%	38%	4	17	12
11	Windwarrior's Noble Poison	2004	Suomi	2	8	2,58%	40%	4	21	8
12	Windwarrior's Flaming Redrose	2005	Suomi	1	8	2,58%	43%	1	4	8
13	Cathy Gray Z Kraje Lichnice	2006	Tsekki	2	8	2,58%	46%	0	0	8
14	Hillhaven Supa Diamond	2008	USA	2	8	2,58%	48%	0	0	8
15	Pavesi Wind Spirit	2007	Australia	1	7	2,26%	50%	3	16	7
16	Windwarrior's Sudden Blue Mist	2011	Suomi	1	7	2,26%	53%	0	0	7
17	Cossaks Ready Steady Go	2001	Suomi	1	7	2,26%	55%	0	0	7
18	Finntrix Blue Assi	1999	Suomi	2	7	2,26%	57%	2	2	7
19	Arctic Blue Bullit Star	1998	Tsekki	1	6	1,94%	59%	1	5	15
20	Windwarrior's She Herself	2007	Suomi	1	6	1,94%	61%	1	5	6

15 narttua on käytetty tuottamaan 50% ajanjakson pentueista.

Jalostukseen käytettyjen narttujen merkittäviä keskinäisiä sukulaisuussuhteita:

- 1. Käytetyimmän Lebensberuf Zirkon Zidanen emä on 10. käytetyin Cossaks Ninna-Mincka, jonka täyssisaren jälkeläinen on Cossaks Unique Beauty.
- 2. käytetyimmän Windwarrior's Unbreakable Blue Icen emä (Windwarrior's Noble Poison) on 11. käytetyin koira, ja sen tytär (Windwarrior's Sudden Blue Mist) on 16. käytetyin koira.
- 8. käytetyimmän koiran, Lebensberuf Nonnplusultran emän täyssisko on 17. käytetyin Cossaks Ready Steady Go.

Jalostukseen käytetyillä nartuilla on näiden mainittujen lisäksi muita, kauempana sukutaulussa esiintyviä yhteisiä esivanhempia.

Myös käytetyimmillä uroksilla ja nartuilla on myös keskenään lukuisia yhteisiä vanhempia ja esivanhempia, kuten voi näin harvalukuisella rodulla olettaakin.

4.1.6. Rodun jalostusurosten ja -narttujen ikä

2000-luvulla jalostukseen käytettyjen urosten jalostuskäytön ikä on vaihdellut 2 vuodesta ja 4 kuukaudesta 6 vuoteen ja 11 kuukauteen. Keskiarvo urosten jalostuskäytön iästä on 4 vuotta.

Samalla aikavälillä jalostukseen käytettyjen narttujen jalostuskäytön ikä on vaihdellut 2 vuodesta ja 6 kuukaudesta 5 vuoteen ja 5 kuukauteen. Keskiarvo narttujen jalostuskäytön iästä on 4 vuotta.

4.1.7. Jalostuskoirien käyttömäärät

UROKSET

Käytetyimpien jalostuskoirien käyttömäärät 1994-2004 vaihtelivat uroksilla 8-39 pentuun, nyt vaihteluvälin ollessa 6-19. Aiemmin yli 20 pentua saaneita koiria oli useita, joten urosten käyttömäärät ovat muuttuneet kohtuullisemmaksi ja monimuotoisuutta suojelevammiksi.

50% ajanjakson 2005-2015 pentueista tuottaa 13 eri koiraa, mikä on kaksi koiraa enemmän kuin 1994-2004. Eri koirien määrä on kuitenkin edelleen vähäinen, ja kun otetaan huomioon että jalostukseen käytettävät urokset voivat olla keskenään hyvin läheistä sukua, tulisi kasvattajien kiinnittää huomiota

eri sukuisten urosten monipuoliseen käyttöön. Yhden uroksen jalostuskäyttömäärät tulee harkita tarkkaan, eikä yhdelle urokselle syntyvien pentujen määrän tulisi ylittää 20 pentua sen elinaikana.

NARTUT

Käytetyimpien jalostusnarttujen pentumäärät vaihtelivat 1994-2004 9-28 pennun välillä. 2005-2015 välillä määrät olivat laskeneet 6-17 pentuun. Yli kymmenen pentua synnyttäneitä koiria 20 käytetyimmän listalla 1994-2004 oli 16 kappaletta, nyt samanlaisia koiria 2005-2015 oli 6 kappaletta. Myös narttujen käyttömäärät ja yhdellä nartulla teetettyjen pentujen määrä on muuttunut kohtuullisemmaksi. Tämä suojaa kannan monimuotoisuutta kunhan käytetyimmät nartut eivät ole keskenään läheistä sukua.

Vuosina 1994-2004 ja 2005-2015 15 koiraa ovat vastanneet 50% aikavälinsä syntyneistä pennuista. Eri narttujen määrä jalostuksessa olisi hyvä saada kasvamaan, sillä käytetyimpien narttujen joukossa on useita koiria, jotka ovat sukua keskenään.

4.1.8. Rodun populaatiot muissa maissa

Australiankarjakoirapopulaatiot eivät merkittävästi eroa suomalaisesta – suomalaisissa sukutauluissa runsaasti käytettyjen koirien jälkeläisiä löytyy ympäri maailman ja niiden jälkeläisiä on saatettu käyttää yhtä runsaasti. Australia ja Amerikka ovat määrällisesti suurimmat australiankarjakoirapopulaatiot, mutta ne ovat lähtöisin samoista koirista, toki kasvattajat ovat omilla valinnoillaan muokanneet suuntia, joihin australiankarjakoiraa ovat halunneet lähteä viemään. Varsinaista linjakkoa rodussa ei ole – rekisteröity australiankarjakoirapopulaatio on ainut tunnettu ja rekisteröity kanta australiankarjakoiria.


Australiankarjakoiria on maailmanlaajuisesti kuitenkin paljon enemmän kuin mitä niitä rekisteröidään. Eri maiden rekisteröintikäytännöt, kasvattajia koskevat rekisteröintiin velvoittavat säännöt ja rekisteröintiä vaativat harrastukset vaihtelevat ja tämä vaikuttaa suuresti siihen, miten suuri osa syntyneistä koirista rekisteröidään. Esimerkiksi Australian National Kennel Councilin mukaan vuonna 2014 vain 17% kaikista syntyneistä koirista rekisteröidään. Mikäli tämä luku pitäisi paikkaansa australiankarjakoirilla, joita rekisteröitiin vuonna 2014 1221 kappaletta, syntyisi australiankarjakoiria

maassa yli 7000 vuodessa. Vaikka luku olisikin laskettu yläkanttiin, on oletettavaa, että paljon jopa puhtasrotuisia australiankarjakoiria jää rekistereiden ulkopuolelle.

Yhdysvallat on toinen rodun valtamaa, jonka rekisteröintikäytännöt vaikeuttavat monipuolista jalostuskoirien käyttöä. Siellä kasvatetaan suuria määriä rekisteröimättömiä australiankarjakoiria ja sen lisäksi kasvattajat valitsevat jo pienistä pennuista ne, jotka jäävät jalostuskäyttöön ja ne joille haetaan vain rajoitettua rekisteröintiä, tällaisia ovat esimerkiksi pentuina lemmikkitasoisiksi koiriksi arvioidut koirat. Tarkoitus kasvattajilla on hyvä – estää koirien holtiton jalostuskäyttö, mutta populaation monipuolisuuden kannalta ratkaisu on huono. Australiankarjakoira oli vuonna 2013 American Kennel Clubin 59. suosituin rotu rekisteröintimäärien (1291 rekisteröityä pentua vuonna 2013) perusteella.

Valitettavasti rodun valtamaissa matadorurosten, uusintayhdistelmien ja tiukkien linjausten tekeminen on edelleen melko yleistä. Rekisteröintimäärien ollessa parhaillaan 100-kertaisia pienempiin maihin verrattuna, yksittäisten kasvattajien toimet eivät tunnu merkittäviltä, mutta kaventavat salakavalasti populaation monipuolisuutta niistä maista, joista ns. uutta verta olisi saatavilla.

Kaavio 1: REKISTERÖINTIMÄÄRIEN VERTAILU 2003-2013



4.1.9. Yhteenveto rodun jalostuspohjan laajuudesta

Australiankarjakoiran jalostuspohjan laajuuden lähtökohdat niin Suomessa kuin maailmalla ovat haastavat – suomalainen populaatio rakentui alkujaan hyvin harvojen, runsaasti käytettyjen koirien varaan. Kun näiden koirien jälkeläisiä käytettiin keskenään, sukusiitosprosentit kasvoivat helposti ja toivat mukanaan myös linja-siitoksen haittoja kuten terveysongelmia. Valistuksen ja tiedon lisääntymisen kautta sukusiitosprosenttien kasvua vuosittain on saatu taittumaan alaspäin ja tiukkoja linjauksia Suomessa pääsääntöisesti vältetään.

Rodun tehollisesta populaatiokoosta on saatavilla vain rajallisesti tietoa, mutta rodun maailmanlaajuisen populaation tehollinen koko on todennäköisesti hyvin lähellä Australiassa tutkittua 57:ää. Geneettisen monipuolisuuden häviämisen estäminen on suuri haaste kasvattajille ja vaatii hyvää yhteistyötä muiden kasvattajien kanssa maailmanlaajuisesti. Yksittäisten jalostuskoirien toistuvaa käyttöä tulee välttää. Samalla on tiedostettava, että suomalaiset australiankarjakoirakasvattajat eivät voi yksin saada tehollista populaatiokokoa kasvatettua tai pysäytettyä geenimuotojen häviämistä, mikäli rodun valtamaissa asiaan ei kiinnitetä huomiota. Suomalaisen populaation monipuolisuutta on silti syytä vaalia.

Jalostukseen käytettävien urosten ja narttujen jälkeläismäärät ovat vuosien saatossa muuttuneet kohtuullisemmiksi, mutta jalostukseen käytetään edelleen liian yksipuolisesti koiria, jotka saattavat myös olla sukua keskenään.

4.1.10. Tärkeimmät jalostuspohjaa kaventavat tekijät

Australiankarjakoiran tärkeimmät jalostuspohjaa kaventavat tekijät:

- Maailmanlaajuisesti rekisteröimättömien koirien suuri osuus
- Linja- ja sisäsiitokseen perustuva jalostus maailmalla
- Euroopassa vaikuttavien koirien lukuisat yhteiset esi-isät
- Jalostuksen kasaantuminen harvoille yksilöille
- Alhainen tehollinen populaatiokoko

4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet

Australiankarjakoira on rotumääritelmän mukaan erinomainen paimenkoira, aina valpas, älykäs, rohkea ja sitkeä. Australiankarjakoirien luonnetta mitataan mm. luonnetestillä, joka soveltuu rodun luonteen arviointiin hyvin. Mh-kuvattujen koirien määrä on vielä vähäinen mutta kasvussa. Myös erilaiset käyttökokeet ja harrastuslajit mittaavat australiankarjakoiran luonnetta ja kertovat sen koulutettavuudesta ja fysiikan toimivuudesta. Alkuperäistä käyttöä mittaavia kokeita ei ole, mutta australiankarjakoiria toimii edelleen etenkin nautatiloilla työkoirina.

Karjakoira soveltuu parhaiten aktiiviseen elämään, jolloin se saa toteuttaa toiminnantarvettaan.

Rodunomaisen australiankarjakoiran arkikäyttäytyminen on tasapainoista, mutta kouluttamattomana ja turhautuneena se voi olla vaikea lemmikki. Yleisimpiä käytösongelmia ovat remmirähjäys, ei-toivottu paimentaminen ja liiallinen varautuneisuus vieraita ihmisiä kohtaan.

Kattavaa käyttäytymiskyselyä kartoittamaan rodun arkielämän käytöstä ei ole tehty.

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta

Australiankarjakoiran rotumääritelmä kuvaa rodun luonnetta näin:

”Rodun uskollisuus ja vartiointivaisto tekevät siitä erinomaisen karjalaumojen sekä isäntänsä omaisuuden itsenäisen vartijan. Luonnostaan epäluuloinen vieraita kohtaan, mutta sen täytyy kuitenkin mukautua käsittelyyn, etenkin näyttelykehässä. Kaikki työkoiralle vieraat luonne- tai rakennepiirteet ovat vakavia virheitä. Australiankarjakoira on verraton karjan vartioija ja kuljettaja niin avoimilla kuin rajatuillakin alueilla. Aina valpas, äärimmäisen älykäs, tarkkaavainen, rohkea, luotettava ja sitkeä, mikä tekee siitä erinomaisen työkoiran.”

Tämän lisäksi rotumääritelmässä australiankarjakoiran hylkääviä virheitä ovat vihaisuus tai liiallinen arkuus.

Rotumääritelmän kuvaus rodun luonteesta on selkeä ja painottuu australiankarjakoirien työskentelyominaisuuksiin. Rodun käyttötarkoitus nautapaimenena käy ilmi rotumääritelmästä.

4.2.2 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa

Aktiivinen ja toiminnanhaluinen australiankarjakoira ei sovi kaikille. Se mukautuu monenlaisiin harrastuksiin ja elinympäristöihin. Onnellisimmillaan se on saadessaan toimia yhdessä oman ohjaajansa kanssa ja australiankarjakoira kiintyy omistajaansa syvästi. Turhautunut australiankarjakoira voi olla ongelmallinen lemmikki. Australiankarjakoiran jalostuksen tavoitteena tulee olla yhteiskuntakelpoinen koira, jolla on hyvä työskentelymoraali, ja sen älykkyyttä ja toiminnantarvetta on varjeltava. Hyvä hermorakenne on tärkeää niin harrastuksien kuin arkielämän kannalta.

4.2.3. Tilanne luonteissa tänä päivänä

Australiankarjakoirista vain murto-osa työskentelee alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Vaikka pentuja säännöllisesti myydään myös työkoiriksi tilallisille niin Suomessa kuin maailmalla, ei täysin alkuperäistä työtä vastaavaa käyttöä niille villien karjalaumojen kuljettajina enää ole – liikenneyhteyksien paraneminen ja nykyaikaiset kuljetusvälineet ovat korvanneet työkoirien käytön karjalaumojen liikuttelussa pitkien matkojen päähän. Karjatiloiilla rodunomainen australiankarjakoira on kuitenkin edelleen monipuolinen ja käyttökelpoinen työkoira.

Työkäytön vähenemisen myötä australiankarjakoiria on alettu kasvattamaan muita tarkoituksia kuin karjanajoa silmälläpitäen. Suomessa luonnetestin avulla pyritään mittaamaan karjakoiran rodunomaista luonnetta. Työkoirina australiankarjakoiria on Suomessa niin vähän, että karjakoirien jalostusta työkäyttö ei pääsääntöisesti ohjaa. Siksi on hyvä että työkoirien lisäksi koiria luonnetestattaisiin ja niiden koulutettavuutta ja muita työskentelyominaisuuksia testattaisiin erilaisten kokeiden kautta. Tärkeimpinä näistä palveluskoirakokeet.

Arjessa tyypillinen australiankarjakoira on tasapainoinen mutta myös haastava koira, joka tarvitsee mielekästä tekemistä. Sen hyviä puolia ovat itsevarma, eloisa ja älykäs luonne ja hyvä koulutettavuus. Toisaalta australiankarjakoira, joka ei saa tarpeeksi aktivointia ja liikuntaa voi olla hyvin vaikeakin koira arkielämässä. Karjakoiran taipumus epäluuloisuuteen ja sen kyky itsenäisiin päätöksiin tulee ottaa huomioon pennusta pitäen ja panostaa arjessa koiran hallittavuuteen. Tyypillisimpiä käytösongelmia australiankarjakoirilla on remmirähjäys ja halu pysäyttää ja kontrolloida esimerkiksi autoja, polkupyöriä tai juoksevia ihmisiä. Koska australiankarjakoiran työskentelytyyliin kuuluu hampaidenkäyttö, on ei-sallittuun paimentamiseen puututtava pienestä pitäen. Liika pidättyväisyys voi hankaloittaa elämää

etenkin kaupunkiympäristössä. Vaikka australiankarjakoira leimautuu voimakkaasti omaan perheeseensä ja etenkin omistajaansa, on eroahdistus rodussa melko harvinaista.

Koska australiankarjakoiran rodunomainen luonne voi olla haastava, tulisi rodusta kiinnostuneille olla tarjolla tietoa ja tukea australiankarjakoiran kanssa elämiseen ja sen kouluttamiseen. Suomessa tyypillisin kodinvaihtaja on nuorehko uros, jonka energiatarpeeseen, fyysiseen voimakkuuteen ja koulutustarpeeseen omistaja ei ole osannut varautua. Luonne- ja käyttäytymisongelmien vuoksi lopetettujen australiankarjakoirien keski-ikä on 4 vuotta ja 8 kuukautta.

4.2.4. Erot eri maiden populaatioiden välillä

Tutkittua tietoa luonne-eroista eri maiden välillä ei ole. Pääsääntöisesti voidaan ajatella, että maissa joissa mittaristo rodun luonteelle on melko samankaltainen (esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa) ovat myös luonteet ja ajatukset oikeanlaisesta luonteesta samankaltaisia. Rodun valtamaissa Australiassa ja Amerikassa laajasti käytettyjä luonteen mittareita ei ole ja rodun sisällä löytyy hyvin paljon vaihtelua luonteiden välillä. Kasvattajien vastuu rodunomaisen ja työskentelyyn kykenevän luonteen säilyttämisessä on suuri. Rodunomainen australiankarjakoira ei sovi kaikille, ja valitettavasti rodun suosion kasvaessa esimerkiksi Amerikassa, yhä enemmän australiankarjakoiria myös hylätään käyttäytymis- ja luonnevaikeuksien takia. Rodun valtamaissa on myös erityisesti hylätyille ja ongelmallisille australiankarjakoirille ja niiden sekoituksille perustettuja löytöeläinkoteja ja rescue-järjestöjä.

4.3. Luonnetesti, MH-luonnekuvaus ja australiankarjakoiran käyttö- ja koeominaisuudet

Luonnetesti ja MH-luonnekuvaus ovat Kennelliiton kaikille roduille avoimia luonteen mittareita, joissa koulutetut tuomarit arvioivat koirien käytöstä ja luonneominaisuuksia. Australiankarjakoiria on luonnetestattu yli 300 kappaletta. MH-kuvauttuja koiria on vasta reilu kymmenen. Testi- ja kuvaustuloksia voidaan käyttää jalostuksen avuksi ja luonteiden periytymisen seurantaan. Niistä voi olla apua myös koiran käyttäytymisen ymmärtämiseen.

4.3.1. Luonnetesti

Luonnetestin tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä tilanteissa, joissa koiran hermostoa rasitetaan. Yksittäisen koiran testitulos kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihannetestitulokseen verrattuina. Testitulosta voidaan hyödyntää myös koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testituloksia yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Luonnetesti on Kennelliiton hyväksymä testi jonka järjestää Kennelliiton jäsenyhdistys ja joka anotaan Palveluskoiraliitolta.

Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat vähintään kahden ja alle seitsemän vuoden ikäisiä sekä Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotettuja ja tunnistusmerkittyjä. Luonnetestissä noudatetaan Kennelliiton antidoping-sääntöjä.

Australiankarjakoiria on luonnetestattu vuodesta 1988 lähtien. Testattuja australiankarjakoiria on vuoden 2015 loppuun mennessä 292 kappaletta, testikäyntejä on yhteensä 305. Luonnetesti on käynyt läpi uudistuksia, vuosien 1996, 2007 ja 2015 alussa ovat astuneet voimaan päivitetty luonnetestisäännöt lomakkeineen. Tulokset testien välillä ovat edelleen vertailukelpoisia vuonna 2015. Australiankarjakoirilla luonnetesti on hyväksytty kun se saavuttaa vähintään +75 pistettä, ja koira on saavuttanut vähintään arvosanan + 1 terävyydessä, hermorakenteessa ja luoksepäästävyudessa sekä arvosanan + laukauspelottomuudesta. Jos testi joudutaan keskeyttämään tai muut ehdot eivät täyty, on testitulos hylätty. Hylätyn testituloksen saanut koira saa uusia testin yhden kerran, vähintään 6 kk edellisestä testistä.

Taulukko 8 LUONNETESTATUT AUSTRALIANKARJAKOIRAT SÄÄNTÖVUOSITTAIN

Sääntövuosi	Testejä	hyväksytty	Hylätty	laukausalttiita	% aikavälin rekisteröinneistä
1988-1995	66	54	12	6	30,3%
1996-2006	106	85	21	11	22,9%
2007-2014	123	96	27	9	48,0%
2015-	15	14	1	0	60,0%
Yhteensä	310	249	61	26	28,8%

Taulukko 9 TESTITULOSTEN JAKAUTUMINEN OSA-ALUEITTAIN

KOKO ROTU	-3	-2	-1	1	2	3	yhteensä
TOIMINTAKYKY	0%	3%	18%	53%	23%	2%	100%
TERÄVYYS	1%	1%	0%	64%	6%	29%	100%
PUOLUSTUSHALU	0%	1%	15%	31%	12%	41%	100%
TAISTELUTAHTO	1%	2%	18%	6%	48%	25%	100%
HERMORAKENNE	0%	0%	7%	78%	14%	0%	100%
TEMPERAMENTTI	0%	1%	3%	13%	40%	44%	100%
KOVUUS	1%	11%	0%	53%	1%	34%	100%
LUOKSEPÄÄSTÄVYYS	0%	0%	2%	3%	33%	62%	100%
LAUKAUSVARMUUS		altis	Ärtynyt	kokematon	Hyväksytty	varma	
		9%	1%	20%	20%	51%	100%
				yhteensä:	71%		
YHTEENSÄ	100%						
HYLÄTTY	19%						
KESKEYTETTY	3%						
LAUKAUSALTTIITA	9%						

Luonnetestitulokset kuvaavat hyvin karjakoirailla esiintyviä luonteen ominaisuuksia ja myös ominaisuuksia joita on hyvä jalostuksessa ottaa huomioon. Työkäytössä koiran rohkeus (toimintakyky) on tärkeä ominaisuus. Taistelutahto on yksi tärkeimpiä moottoreita harrastuskoirille, ja ominaisuutta pitää jalostuksessa vaalia. Hyvä hermorakenne on tarpeellinen niin työ-, harrastus-, kuin kotikoirallekin. Australinakarjakoira ei saa olla liian pehmeä, vaan sen pitää kyetä jatkamaan työskentelyä vaikka sille tapahtuisikin jotain epämiellyttävää. Temperamenttiltaan liian vilkas tai toisaalta passiivinen koira ei ole ihanteellinen työkoiraksi. Karjakoiran pitäisi olla eloisa, mutta tasapainoinen. Testituloksista kohtuullisen vilkas ja vilkas kuvaavat hyvin rodunomaista temperamenttia. Laukausalttius on yksi voimakkaimmin periytyvistä luonneominaisuuksista, ja jalostukseen käytettävällä koiralla tulisi olla hyväksytty tulos laukausvarmuudesta.

Taulukko 10 AUSTRALIANKARJAKOIRIEN HENKISET OMINAISUUDET NYKYTILANNE JA TAVOITE

NYKYTILANNE	TAVOITE
Toimintakyky: KOHTUULLINEN	+1a KOHTUULLINEN +2 HYVÄ
Terävyys: PIENI ILMAN JÄLJELLEJÄÄVÄÄ HYÖKKÄYSHALUA	+1a PIENI ILMAN JÄLJELLEJÄÄVÄÄ HYÖKKÄYSHALUA
Puolustushalu: KOHTUULLINEN HILLITTY	+2 SUURI, HILLITTY +3 KOHTUULLINEN, HILLITTY
Taisteluhalu: KOHTUULLINEN	+3 SUURI +2a KOHTUULLINEN
Hermorakenne: HIEMAN RAUHATON	+2 TASAPAINOINEN
Temperamentti: VILKAS	+3 VILKAS
Kovuus: HIEMAN PEHMEÄ	+3 KOHTUULLISEN KOVA
Luoksepäästävyys: HYVÄNTAHTOINEN LUOKSEPÄÄSTÄVÄ AVOIN	+3 HYVÄNTAHTOINEN LUOKSEPÄÄSTÄVÄ AVOIN
Laukausvarmuus: LAUKAUSVARMA	LAUKAUSVARMA

Jalostuksen tavoitteena tulee olla hyvien luonneominaisuuksien vaaliminen. Kaikissa koiraroduissa luonnetestin arvosanan toimintakyky +2 hyvä ja hermorakenne +2 tasapainoinen saa vähemmistö koirista. Ei ole realistista olettaa että jalostuksella saataisi valtaosaa australiankarjakoirista saamaan näitä arvioita luonnetestissä. Koiria, jotka tällaisia arvioita luonnetestissä saavat, olisi kuitenkin hyvä käyttää jalostukseen, mikäli ne muilta ominaisuuksiltaan ovat soveltuvia jalostuskoiria.

Taulukko 11 LUONNETESTIT 2000-2015

Vuosi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HYV	8	6	8	7	13	8	18	8	18	16	22	6	11	7	8	14
HYL	4	1	6	1	2	2	3	4	7	0	3	3	1	5	4	1
Yht.	12	7	14	8	15	10	21	12	25	16	25	9	12	12	12	15

Luonnetestissä käy kiitettävä osa rodun rekisteröinneistä ja tulosten perusteella pystytään tekemään päätelmiä suomalaisen australiankarjakoirapopulaation luonteenpiirteistä. Hyväksytty luonnetesti Suomen muotovalion arvon ehtona on yksi testausaktiivisuutta ylläpitävä seikka. Lisäksi kasvattajien kannustus kasvatienomistajien testaamiseen ja luonnetestituloksen arvostaminen jalostuksessa ovat tärkeitä tekijöitä testausaktiivisuuden ylläpidossa.

Suomen australiankarjakoirat ry myös on järjestynyt luonnetestejä, joihin australiankarjakoirat ovat etusijalla. Tätä käytäntöä on hyvä jatkaa, sillä yhdistyksen järjestämiin testeihin hakeutuu yleensä useita australiankarjakoiria.

4.3.2. MH-kuvaus

MH-luonnekuvauksessa koira käy läpi kymmenen eri testiosiota, jossa kuvataan koiran 31 eri käyttäytymisreaktiota. Luonnekuvauksen aikana kaksi kuvaajaa tarkastelevat koiran luonteenominaisuuksia kuten leikkisyyttä, pelkoa, saalisviettiä ja sosiaalisuutta. Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat vähintään 18 kuukauden ikäisiä.

MH:n tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa.

Kuvaustuloksia roduttain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta.

Yksittäisen koiran MH kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuina.

Mh-kuvaus otettiin käyttöön Suomessa virallisesti vuonna 2010 joten testimäärät ovat huomattavasti vähäisemmät kuin perinteisessä luonnetestissä. Vuosittain australiankarjakoiria testataan vain muutama, lokakuuhun 2015 mennessä Suomessa mh-kuvattuja koiria on yhteensä 13 kappaletta. Tämän lisäksi koiria on mh-kuvattu myös Ruotsissa Ruotsin kennelliiton säännöillä, jotka poikkeavat

osittain mm. testausiän suhteen Suomessa käytössä olevista säännöistä. Ruotsissa mh-kuvattuja, koiria on yhteensä 262. Ruotsalaisten koirien keskiarvo on ruotsissa rekisteröityjen ja vuosina 2007-2014 testattujen keskiarvo.

Taulukko 12 MH-KUVATUT KOIRAT SUOMESSA , KESKIARVOT SUOMI & RUOTSI

		1	2	3	4	5	Keskiarvo Suomi	Keskiarvo Ruotsi
1A	Kontakti, tervehtiminen	0	0	1	11	1	4,0	3,7
1B	Kontakti, yhteistyö	1	0	5	7	0	3,4	3,4
1C	Kontakti, käsittely	1	3	6	2	1	2,9	3,2
2A	Leikki1, leikkihalu	0	0	3	8	2	3,9	3,9
2B	Leikki1, tarttuminen	0	1	4	5	3	3,8	3,6
2C	Leikki1, puruote ja taisteluhalu	2	3	5	1	2	2,8	3,2
3A1	Takaa-ajo1	6	5	1	1	0	1,8	
3A2	Takaa-ajo2	8	1	1	3	0	1,9	3,0
3B1	Tarttuminen1	11	1	1	0	0	1,2	
3B2	Tarttuminen2	9	3	0	1	0	1,5	2,7
4	Aktiviteettitaso	0	1	7	5	0	3,3	3,2
5A	Etäleikki, kiinnostus	0	7	6	0	0	2,5	2,8
5B	Etäleikki, uhka/aggressio	13	0	0	0	0	1,0	1,4
5C	Etäleikki, uteliaisuus	5	2	3	2	1	2,4	2,7
5D	Etäleikki, leikkihalu	6	4	0	1	2	2,2	2,6
5E	Etäleikki, yhteistyö	6	0	4	2	1	2,4	2,0
6A	Yllätys, pelko	1	2	10	0	0	2,7	2,8
6B	Yllätys, puolustus/aggressio	7	4	2	0	0	1,6	2,0
6C	Yllätys, uteliaisuus	3	2	3	3	2	2,9	3,2
6D	Yllätys, jäljellejäävä pelko	6	1	2	3	1	2,4	1,6
6E	Yllätys, jäljellejäävä kiinnostus	9	3	1	0	0	1,4	1,6
7A	Ääniherkkyys, pelko	1	1	8	1	2	3,2	2,5
7B	Ääniherkkyys, uteliaisuus	0	3	2	2	6	3,8	4,2
7C	Ääniherkkyys, jäljellejäävä pelko	8	0	2	3	0	2,0	1,3
7D	Ääniherkkyys, jäljellejäävä kiinnostus	12	1	0	0	0	1,1	1,6
8A	Aaveet, puolustus/aggressio	5	6	2	0	0	1,8	2,4
8B	Aaveet, tarkkaavaisuus	0	1	6	6	0	3,4	3,7
8C	Aaveet, pelko	1	2	5	3	2	3,2	3,1
8D	Aaveet, uteliaisuus	2	3	1	4	3	3,2	3,1
8E	Aaveet, kontaktinotto aaveeseen	1	0	1	10	1	3,8	3,3
9A	Leikki2, leikkihalu	0	0	6	6	1	3,6	3,6
9B	Leikki2, tarttuminen	0	7	2	4	0	3,8	3,3
10	Ampuminen	3	4	6	0	0	2,2	1,6

Suomessa testattujen koirien määrä on niin vähäinen, ettei testituloksista voida tehdä pitkälle meneviä päätelmiä – yksittäisen koiran poikkeava testitulos voi muuttaa esimerkiksi keskiarvoa huomattavasti. Testitulokset näyttävät kuitenkin olevan lähellä Ruotsin vastaavia.

4.3.3. Käyttö- ja koeominaisuudet

Rodun alkuperäinen käyttö

Rodun alkuperäinen käyttö on ollut suurien nautalaumojen kuljettaminen ja suojeleminen. Australiankarjakoiran alkuperäistä käyttötarkoitusta mittaavia testejä ja kokeita ei ole. Suomessa järjestettävät paimennuskokeet tehdään lampailla. Australiankarjakoiraa voidaan käyttää myös lammaspaimenena, mutta alkuperäisen työkäyttöön kykenemistä mittaisi parhaiten naudoilla tehty paimennuskoe.

Alkuperäiset, rodunomaiset käyttäytymistarpeet ja niiden täyttäminen

Australiankarjakoiraa on monipuolinen ja hyvän koulutettavuuden omaava paimenkoira, jonka toiminnantarpeen täyttäminen on tärkeää. Rodunomainen australiankarjakoiraa on aktiivinen, fyysistä rasitusta ja aivotyöskentelyä tarvitseva rotu. Se on onnellinen saadessaan työskennellä yhdessä ihmisen kanssa. Monet harrastuslajit vastaavat karjakoiran toiminnantarpeeseen työkäytön lisäksi. Australiankarjakoiria kilpailee monissa eri lajeissa, mikä kielii rodun mukautumisesta eri työtehtäviin sekä koulutuksellisesta monipuolisuudesta.

4.3.3.1. Kokeet

AGILITY

Agility on koirien esteratakilpailu, jossa ohjaaja ohjaa koiran suorittamaan radalla olevat esteet liikkumalla, kehonsa liikkein ja ääntään käyttäen. Laji kehitettiin alunperin näytöslajiksi esteratsastuksen pohjalta Englannissa 1970-luvulla. Lajissa ihminen ohjaa koiran läpi tuomarin suunnitteleman radan virheettömästi ja mahdollisimman nopeasti koskematta koiraan ja esteisiin.

Agilityssa menestyminen vaatii koiralta hyvää fyysistä kuntoa, yhteiskuntakelpoisuutta sekä toimintakykyä. Lisäksi ensiarvoisen tärkeässä asemassa on toimiva yhteistyö ohjaajan kanssa. (Suomen agilityliitto, 2015)

Agilityssä australiankarjakoiria on kilpaillut vuodesta 1993 lähtien. Australiankarjakoiria kilpailee jokaisessa agility-luokassa, sekä kahdessa eri säkäluokassa säkäkorkeuden mukaan. Maxi-luokassa kilpailevat koirat ovat säkäkorkeudeltaan 43 cm tai yli, medi-luokassa kilpailevat alle 43 cm, mutta yli 35 cm korkeat koirat. Suurin osa australiankarjakoirista kilpailee maxi-luokassa.

Taulukko 13 AGILITYSSÄ KILPAILLEET AUSTRALIANKARJAKOIRAT KORKEIMMAN KILPAILULUOKAN MUKAAN

	UROKSET	NARTUT	YHTEENSÄ
1-LUOKKA	12	9	21
2-LUOKKA	3	10	14
3-LUOKKA	3	7	9
YHTEENSÄ	18	26	44

Narttujen suurempaa osuutta agilitykoirina voi osittain selittää nartun urosta kevyempi rakenne. Lisäksi osa uroksista voi olla hyvin kiihkeitä ja vaikeasti hallittavia radalla. Nartuissa on myös mahdollista saada medi-kokoinen harrastuskaveri. Australiankarjakoira on maksikoiraksi varsin pieni ja vantterra, joten pitkää urheilu-uraa edesauttaa jos koira mitataan mediluokkaan maksiluokan sijaan. Menestyneitä, pitkän agilityuran tehneitä koiria on kuitenkin myös maksikokoisissa australiankarjakoirissa.

Taulukko 14 AGILITYN VUOSITTAISET KILPAILUMÄÄRÄT KILPAILULUOKITTAIN 2000-2015

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	26	17	16	5	21	25	13	59	38	67	68	102	31	58	80	17
II	13	39	2	2	8	5	0	0	30	1	0	50	31	12	5	59
III	23	40	40	30	27	52	8	0	0	14	11	2	66	98	52	44
yhteensä	62	96	58	37	56	82	21	59	68	82	79	154	128	168	127	120

Vielä 2000-luvun alussa kilpailut keskittyivät pääsääntöisesti kesäkaudelle, sillä tarkoitukseen sopivia halleja oli kohtuullisen vähän. Agilityhallien yleistyminen mahdollistaa koirille pidemmän kilpailukauden ja kilpailusuoritusten määrä on nousussa, vaikka kilpailevien koirien määrä on pysynyt vuosien saatossa suunnilleen samana. Vuosittain agilityssä kilpailee 3-7 kappaletta australiankarjakoiria.

Agilityvalioita australiankarjakoirissa on kaksi kappaletta, vuonna 2003 valioitunut Cattlefarm's Hardtoget Håkan ja vuonna 2016 hyppyvalion arvon saavuttanut Wallaroo Miss Money Penny. Koira saa Suomen agilityvalion (FI AVA) arvon, kun sillä on agilitykilpailujen korkeimmassa tasoluokassa kolme agilitysertifikaattia kolmelta eri agilitytuomarilta. Ensimmäisen ja viimeisen sertifikaatin välillä tulee olla vähintään yksi (1) vuosi ja yksi (1) päivä. Lisäksi koiran tulee olla palkittu näyttelyssä vähintään arvosanalla "hyvä" aikaisintaan 15 kuukauden ikäisenä. Suomen hyppyvalion (FI AVA-H) arvon ehtona on kolme hyppysertifikaattia kolmelta eri agilitytuomarilta, muuten ehdot ovat samat kuin agilityvaliossakin.

Taulukko 15 MENESTYNEIMMÄT AGILITYKOIRAT

	Koiran nimi	s.vuosi	Kilpailuluokka	Nollatuloksia 3-luokassa
1.	Cattlefarm's Hardtoget Håkan	1997	Maxi3	FI AVA, 36 kpl
2.	Wallaroo Miss Money Penny	2008	Medi3	FI AVA-H, 33 kpl
3.	Cattlefarm's Femme Fatale	2003	Maxi3	6 kpl
4.	Muskogees Acapulco	1991	Maxi3	4 kpl
5.	Lebensberuf Ozna Orellana	2006	Maxi3/Medi3*	3 kpl
5.	Worrigal Frozy Benjamin	2007	Maxi3	3 kpl
7.	Woylie's Karkki	2013	Medi3	2 kpl
8.	Cattlefarm's Darra Power	1999	Maxi3	1 kpl
8.	Cossaks Vanity Fair	2005	Medi3	1 kpl
9.	Lebensberuf Gratisexemplar	2006	Maxi3	0 kpl

*koira uusintamittattu ja siirretty toiseen säkäluokkaan

Australiankarjakoiran hyvä koulutettavuus, toimintakyky, kyky nopeisiin reaktioihin ja älykyys tekevät siitä miellyttävän agilitykoiran. Agilityssä australiankarjakoira pääsee tyydyttämään toiminnantarvettaan ja käyttämään fysiikkaansa. Joillekin koirille agility on kuitenkin liian kiihdyttävä laji, jolloin koiran hallintaan radalla joutuu kiinnittämään erityistä huomiota. Lisäksi joidenkin koirien liika raskaus ja/tai luusto-ongelmat (etenkin kyynärviat ja selkävaivat) voivat estää tai päättää tavoitteellisen agilityharrastuksen.

TOTTELEVAISUUSKOKEET

Tottelevaisuuskokeen eli tokon tavoitteena on opettaa koiralle miellyttävää ja hallittua käyttäytymistä sekä koiran ohjaajalle oikeaa ja asiallista koiran käsittelytaitoa. Tottelevaisuuskokeessa tuomari arvioi koiralle opetettujen liikkeiden hallintaa sekä koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä. Koeluokkia on yhteensä neljä: alokasluokka, avoin luokka, voittajaluokka ja erikoisvoittajaluokka. Koira saa siirtyä korkeampaan luokkaan yhdellä 1-tuloksella. Kolmen 1-tuloksen jälkeen koira saa koulutustunnuksen TK1-TK4 ja siirtyy ylempään luokkaan. Kokeeseen saavat osallistua kaikki tunnistusmerkityt ja Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotetut 10 kk täyttäneet koirat. Erikoisvoittajaluokkaan saavat osallistua 15 kk täyttäneet koirat.

Tottelevaisuuskokeissa australiankarjakoiria on käynyt vuodesta 1989 lähtien. Lajin suosio on ollut vakaata ja se on osallistujamäärältään suosituin harrastuslaji rodun keskuudessa. Australiankarjakoiria kilpailee kaikissa tottelevaisuuskokeen luokissa. Yhteensä 85 eri koiraa on osallistunut tottelevaisuuskokeisiin. Vuodessa tottelevaisuuskokeissa kilpailee 10-15 eri koiraa.

Taulukko 16 TOTTELEVAISUUSKOKEISSA KILPAILLEET AUSTRALIANKARJAKOIRAT KORKEIMMAN KILPAILULUOKAN MUKAAN

	UROKSET	NARTUT	YHTEENSÄ
ALOKASLUOKKA	22	17	39
AVOIN LUOKKA	12	18	30
VOITTAJALUOKKA	3	4	7
ERIKOISVOITTAJALUOKKA	7	2	9
YHTEENSÄ	44	41	85

Kilpailleet australiankarjakoirat jakautuvat sukupuolen perusteella varsin tasaisesti.

Erikoisvoittajaluokassa kilpailleista australiankarjakoirista suurin osa on uroksia, kun narttuja on enemmän alemmissa luokissa.

Taulukko 17 TOTTELEVAISUUSKOEKÄYNNIT 2000-2015

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ALO	11	5	15	9	4	6	9	18	19	22	18	3	7	4	4	13
AVO	15	9	6	13	12	10	11	11	11	3	6	11	10	3	1	4
VOI	1	0	1	8	0	0	0	4	10	15	2	4	7	12	8	0
EVL	0	0	3	9	20	13	8	6	6	10	5	14	11	15	9	6
yhteensä	27	15	25	39	36	29	28	39	46	50	31	32	35	34	22	23

Australiankarjakoiran nopeaoppisuus ja älykkyys tekevät siitä hyvän tokokoiran. Australiankarjakoira palkkautuu yleensä hyvin sekä leluilla, taisteluleikeillä ja ruokapalkalla. Uuden oppiminen on karjakoiralle mielekästä. Haasteita tottelevaisuuskoulutuksessa voi aiheuttaa koiran ohjaajapehmeys – esimerkiksi ohjaajan jännitys kokeessa saattaa aiheuttaa joissain koirissa paineistumista ja haluttomuutta. Pääsääntöisesti australiankarjakoirat ovat kuitenkin tottelevaisuuskokeissa reippaasti ja halukkaasti esiintyviä koiria.

Taulukko 18 MENESTYNEIMMÄT TOKOKOIRAT

	Koiran nimi	s.vuosi	1-tuloksia erikoisvoittajaluokassa
1.	Cattlefarm's Darra Power	1999	FI TVA, 6 kpl
2.	Lebensberuf Marine Mercedes	2001	FI TVA, 5 kpl
2.	Worrigal Copperkalgorlie	2004	TK4, 5 kpl
4.	Cattlepark's Explosion Power	2005	FI TVA, 3 kpl
5.	Cossaks Zara Rose	2008	2 kpl
6.	Gravan Silverpark Fiance forMKandHS	2007	1 kpl
7.	Arttulan Alkuvoima	1999	0 kpl
7.	Wallaroo Frodo Baggins	2001	0 kpl
7.	Iznogood Farvardin	2010	0 kpl

Tottelevaisuusvalioita rodussa on kolme kappaletta. Rodun ensimmäinen tottelevaisuusvalio, Cattlefarm's Darra Power valioitui vuonna 2004. Vuonna 2006 valioitui Lebensberuf Marine Mercedes, ja tuorein valio on 2013 valioitunut Cattlepark's Explosion Power. Lisäksi Worrigal Copperkalgorlie on saavuttanut tarvittavan määrän ykköstuloksia, ansaiten koulutustunnuksen TK4. Koira saa tottelevaisuusvalion arvon, kun sillä on 3 x 1. palkinto tottelevaisuuskokeen erikoisvoittajaluokassa vähintään kahden eri palkintotuomarin arvostelemana sekä vähintään laatumaininta "hyvä" näyttelyssä.

PALVELUSKOIRAKOKEET

Palveluskoirakokeet on kehitetty palveluskoirarotujen käyttökokeiksi, joissa tarkistetaan koiran luontaiset taipumukset suoriutua erilaisista tehtävistä ja kyky omaksua sille annettu koulutus. Koska

läheskään kaikki palveluskoirarotuiset koirat eivät voi olla työkoiria ovat käyttökokeet oiva keino tarkistaa koiran soveltuvuus palveluskoiratehtäviin. Kokeiden avulla voidaan havaita ja huomioida koiran koulutettavuuteen vaikuttavat periytyvät ominaisuudet.

Palveluskoirakoelajeja ovat: jälkikokeet, hakukoe, viestikoe, etsintäkoe, suojelukokeet, pelastuskoirakokeet, valjakkohiihto ja opastuskoe. Kokeet sisältävät tottelevaisuus- ja maasto-osuudet, lukuun ottamatta erikoisjälkikoetta ja valjakkohiihtoa, joissa on vain varsinainen maasto-osuus.

Tottelevaisuusosuudessa tarkistetaan koiran ohjattavuus, temperamentti, vietti- ja työskentelykestävyys sekä hermorakenne erilaisilla suorituksilla, kuten paikalla makaaminen, seuraaminen ohitettavista ihmisistä, liikkeestä istuminen, liikkeestä seisominen ja liikkeestä maahanmeno, luoksetulo, eteen lähetys sekä esineen noutaminen tasamaalla ja ylittämällä erilaisia esteitä.

Kokeiden maasto-osuuksissa hyödynnetään koiran erinomaista hajuaistia erilaisissa etsintätehtävissä. Jäljestämiskokeissa koiran tehtävänä on ihmisen kulkeman jäljen seuraaminen eli jäljestäminen. Hakukokeessa koira etsii piiloutuneita ihmisiä. Viestikokeessa koira juoksee maastossa vieden viestiä kahden ohjaajan välillä. Kaikissa kansallisissa lajeissa on lisäksi esine-etsintä, jossa koira etsii ja tuo ohjaajalleen maastoon pudotettuja esineitä. Suojelukokeissa koiran tulee puolustaa itseään ja ohjaajaansa uhkaavasti käyttäytyvää vierasta vastaan ja lisäksi kokeessa on jäljestämisosuus.

Kokeisiin saavat osallistua koirarodut, joille Suomen Kennelliiton hallitus on Suomen Palveluskoiraliiton hallituksen esityksestä myöntänyt kilpailuoikeuden tai joille FCI on hyväksynyt palveluskoiraroduiksi. Australiankarjakoira ei kuulu näiden hyväksytyjen rotujen joukkoon.

1.1.2004 voimaantuneen vähemmäiskoeläinlain mukaan, mikäli palveluskoirakokeen kilpailuoikeuden omaavan rodun koirista yksikään ei ole kolmen viimeisen vuoden aikana saavuttanut palveluskoirakokeissa hyväksyttyä tulosta, menettää rotu Kennelliiton hallituksen päätöksellä oikeuden osallistua palveluskoirakokeisiin. Pitääkseen palveluskoirakoeoikeutensa, tulee australiankarjakoiran saada hyväksytty koetulos vähintään kerran kolmessa vuodessa. Mikäli rodulta poistetaan kilpailuoikeus, voi rotujärjestö hakea kilpailuoikeuksia heti, kun rotu täyttää kaikki oikeuksien myöntämiselle asetetut vaatimukset.

Palveluskoirakoeoikeuksien myöntämisen edellytykset Kilpailuoikeutta anottaessa rodun tulee täyttää seuraavat ehdot:

- Rodun tulee olla fyysisiltä ominaisuuksiltaan sellainen, että se vaivattomasti pystyy suoriutumaan palveluskoirakokeiden 3-luokan vaatimuksista.
- Viimeisen kahden vuoden aikana vähintään viiden kyseisen rotuisen koiran tulee olla suorittanut käyttäytymiskoe hyväksytysti.
- Rodun rotujärjestön tulee yleiskokouksessaan tehdä päätös kilpailuoikeuksien anomisesta.
- Rodun käyttövalio arvo määräytyy Suomen Kennelliiton valionarvosääntöjen mukaisesti.

Australiankarjakoira sai palveluskoiraoikeudet vuonna 1990 ja samana vuonna ensimmäinen koira jo kilpailikin hakukisoissa.

KÄYTTÄYTYMISKOE (BH)

Käyttäytymiskokeen tarkoituksena on selvittää koiran yhteiskuntakelpoisuus, ja vain koulutustunnuksen (BH) saavuttaneet koirat saavat myöhemmin osallistua palvelus- ja pelastuskoirakokeisiin. Käyttäytymiskoe muodostuu kahdesta osuudesta, tottelevaisuusosuudesta ja niin sanotusta kaupunkiosuudesta.

Tottelevaisuusosuus muodostuu palveluskoirakokeiden tottelevaisuusosuutta mukailevasta osuudesta. Hyväksytty tottelevaisuusosuuteen vaaditaan vähintään 70% maksimipistemäärästä.

Kaupunkiosuus suoritetaan yleisellä paikalla, jossa tarkistetaan koiran normaali suhtautuminen arkielämän ärsykeisiin, kuten ohikulkijoihin, liikenteeseen ja toisten koirien ohittamiseen. Koetta ei arvostella pistein, vaan tuomari tarkkailee koiraa eri tilanteissa ja niiden perusteella joko hyväksyy tai hylkää sen suorituksen.

Koulutustunnuksen BH saa koira, joka suorittaa molemmat osuudet hyväksytysti.

Vuonna 1999 ensimmäinen australiankarjakoira osallistui käyttäytymiskokeeseen (BH). Vuonna 2000 käyttäytymiskokeen suorittamisesta tuli pakollinen esikoe kaikkiin palvelus- ja pelastuskoirakokeisiin. Suomessa 58 australiankarjakoira on suorittanut BH-kokeen hyväksytysti vuoteen 2015 mennessä.

Taulukko 19 BH-KOEKÄYNNIT 1999-2015

VUOSI	PAKK1 HYVÄKSYTTY	PAKKO HYLÄTTY	YHTEENSÄ
2015	3	0	3
2014	4	2	6
2013	2	1	3
2012	1	1	2
2011	4	0	4
2010	3	0	3
2009	5	1	6
2008	7	1	8
2007	2	2	4
2006	4	1	5
2005	3	0	3
2004	0	1	1
2003	6	0	6
2002	3	3	6
2001	6	1	7
2000	4	1	5
1999	1	0	1
YHTEENSÄ	58	15	73

Palveluskoirakokeiden lajeista suosituimmat australiankarjakoirien kanssa ovat haku- ja jälkikokeet. Koulutustunnuksia australiankarjakoirilla on kuitenkin lähes kaikista palveluskoiraliiton alaisista lajeista valjakkohiihtoa ja opastuskoetta lukuun ottamatta. Lajeista saadut koulutustunnukset jakautuvat seuraavasti.

Taulukko 20 KOULUTUSTUNNUKSET PALVELUSKOIRAKOELAJEITTAIN

KOELAJI	1-LUOKKA	2-LUOKKA	3-LUOKKA	YHTEENSÄ
ERIKOISJÄLKI	2	0	0	2
ETSINTÄKOE	3	2	9	14
HAKUKOE	20	15	17	52
JÄLKI	25	16	25	66
SUOJELUKOE	2	1	0	3
VIESTIKOE	1	1	8	10
YHTEENSÄ	53	35	59	147

Koekäyntien määrä on rodulla pysynyt tasaisena koko 2000-luvun. Kokeisiin osallistuvien koirien määrä on pieni ja koekäyntejä on vuosittain muutamasta yksittäisestä käynnistä lähes 20 koekäyntiä vuodessa. Rodun suosio palveluskoirana on pienimuotoista mutta vakaata.

Taulukko 21 KOEKÄYNNIT KOELAJEITTAIN 2000-2015

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erikoisjälki	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	1
Etsintä	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Haku	15	1	4	7	13	12	12	3	8	8	5	1	0	1	1	2
Jälki	11	9	2	6	5	7	0	1	0	3	4	5	8	0	0	5
Suojelu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Viesti	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	3	2	0	0	0
yhteensä	27	10	6	13	18	21	12	6	12	14	11	9	12	1	1	8

Australiankarjakoira saavuttaa käyttövalion arvon saatuaan samasta palvelus- tai pelastuskoira (IPOR) koelajista 3 kertaa 1-tuloksen tai vähintään arvosanan erittäin hyvä, joka on vähintään 90% maksimi pistemäärästä, lajin ylimmässä luokassa, vähintään kahden eri kalenterivuoden aikana ja vähintään kahdelta eri tuomarilta. Koiralla tulee olla näyttelystä vähintään laatuarvosana ”hyvä”.

Rodussa on neljä käyttövaliota. Rodun ensimmäinen käyttövalio on vuonna 1996 valioitunut Cranefield's Blue Xmasstar, joka valioitui yleiskokeessa (nykyinen etsintäkoe). Vuonna 2000 käyttövalion arvon jälkikokeessa saavutti Kohon Crocodile Candy. Hakukokeessa valioituneita koiria rodussa on kaksi kappaletta, Kivimannun Blue Abs (valioitunut 2004) ja Iznogood Bad Boy Blue (valioitunut 2006).

Taulukko 22 MENESTYNEIMMÄT PALVELUSKOIRAT

	Nimi	s. vuosi	Koulutustunnuksia 3-luokassa
1.	Worrigal Copperkalgorlie	2004	15 kpl
2.	Kohon Crocodile Candy	1994	FI KVA, 13 kpl
3.	Kivimannun Blue Abs	2000	FI KVA, 11 kpl
4.	Cranefield's Blue Xmasstar	1988	FI KVA, 10 kpl
5.	Iznogood Bad Boy Blue	2000	FI KVA, 5 kpl
6.	Arttulan Alkuvoima	1999	2 kpl
7.	Cattlefarm's Hoped Blue Boy	1997	1 kpl
7.	Cranefield's Eldorado	1989	1 kpl
7.	Ligras Kim Orange Boy	1990	1 kpl
7.	Tyyris-Tyllerön Anastashia	1995	1 kpl

Australiankarjakoiran vahvuudet palveluskoiratoimintaan ovat sen väsymätön työskentelyhalu ja hyvä ohjattavuus sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn. Karjakoira on kokonsa nähden montaa perinteistä palveluskoirarotuista koiraan raskasrakenteisempi ja pienempi mutta fyysisesti terveelle australiankarjakoiralle palveluskoirakokeiden rasitus ei ole ongelma. Australiankarjakoiran monikäyttöisyydestä palveluskoirana kertoo sekin, että useilla koirilla on tuloksia monista eri palveluskoiralajeista. Esimerkiksi rodun menestyneimmällä palveluskoiralla Worrigal Copperkalgorliella, on koulutustunnuksia haku-, jälki-, viesti-, erikoisjälki-, ja etsintäkokeesta.

PELASTUSKOIRAKOKEET

Pelastuskoiralla tarkoitetaan kadonneiden ihmisten etsintään, viranomaisten avuksi, koulutettua ja tarkastettua koira, joka kutsutaan tarvittaessa avustamaan etsinnässä. Käytännön etsintätehtävät voivat sisältää muun muassa metsään eksyneen etsintää ja poikkeusoloissa ihmisten etsintää sortuneista rakennuksista.

Etsinnöissä pelastuskoira on erinomainen apu tarkan hajuaistinsa, kestävyytensä ja ketteryytensä ansiosta. Koira kykenee seuraamaan useita tunteja vanhoja jalanjälkiä, jotka eivät ole silmin nähtävissä. Etsintäkoirat soveltuvat raunioille kokonsa ja ketteryytensä ansiosta ja pääsevät nopeasti ahtaisiinkin

paikkoihin. Ne myös kykenevät havaitsemaan ja ilmaisemaan ihmisen tämän ollessa useita metrejä sortumien alla.

Pelastuskoiratoimintaa ei ole rajattu vain tietyn rotuisille koirille, mutta koiran on oltava rakenteeltaan terve ja hyväkuntoinen. Pelastuskoiran tulee olla sekä ihmisille että toisille koirille ystävällinen ja luottavainen. Sillä tulee olla erinomainen hajuaisti ja taipumus sen käyttämiseen ohjaajan ohjauksessa.

Pelastuskoirien koulutustaso todetaan pelastuskoirakokeissa, joissa oleellisinta on erinomainen vainutyöskentely. Koe käsittää tottelevaisuusosuuden ja jonkin kolmesta lajista: jälki, haku, raunio. Kansallisissa pelastuskoirakokeissa ei koesuorituksista anneta pisteitä vaan tuomari arvioi koiran suorituksen, joko hyväksytyksi tai ei hyväksytyksi.

Australiankarjakoiria on osallistunut pelastuskoirakokeisiin vuodesta 2001 lähtien. Yhteensä kahdeksan koiraa on osallistunut kokeisiin ja ylivoimaisesti suosituin pelastuskoiralaji australiankarjakoirilla on rauniokoe. 31 koekäynnistä 24 on tehty rauniokokeessa.

Taulukko 23 PELASTUSKOIRAKOEKÄYNNIT 2001-2015

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YHTEENSÄ
2	5	7	2	4	0	4	1	5	1	0	0	0	0	0	31

Osallistuminen pelastuskoirakokeisiin on ollut vain harvojen koirien ja ohjaajien varassa.

Pelastuskoirakokeet vaativat muita harrastuslajeja enemmän paneutumista myös ohjaajalta, esimerkiksi erilaisille etsintä-, ensiapu-, suunnistus- ja viestintäkurseille osallistumista ja hyvää sitoutumista harjoitteluryhmään. Australiankarjakoiran ketteryys ja voimakkuus ja näppärä koko yhdistettynä sen hyvään koulutettavuuteen, tekevät siitä kelvollisen pelastuskoiran. Joillain yksilöillä pidättyväisyys vieraita ihmisiä kohtaan voi haitata harrastusta.

VESIPELASTUS

Vesipelastus eli VEPE on alun perin landseereille ja newfoundlandinkoirille kehitetty rodunomainen koemuoto, jonka tarkoituksena on ylläpitää pelastusvaistoa ja uintitaitoa. Kokeella testataan koiran fyysistä kuntoa ja kykyä toimia vedessä. Tämä vauhdikas ja märkä laji rantautui Suomeen 1989 ja virallinen koemuoto se on ollut vuodesta 1992 lähtien.

Nykyisin vesipelastus koemuotona on avoin kaikille roduille, paitsi x-rotuisille. Tosin lajin fyysinen vaativuus asettaa rajoja osallistumiseen. Koiran on pidettävä uimisesta, lisäksi sen on oltava fyysisiltä ominaisuuksiltaan tarpeeksi vahva hinaamaan rantaan hukkuvaa tai venettä, välillä hyvinkin tuulisissa olosuhteissa. Koiran on oltava myös sosiaalinen ja perustottelevaisuuden tulee olla kunnossa.

Australiankarjakoiria on kilpaillut vesipelastuskokeissa yhteensä kahdeksan kappaletta vuodesta 2004 lähtien. Rodussa on yksi vesipelastusvalio, vuonna 2007 valioitunut Cattlefarm's Concord Kössi. Kaksi australiankarjakoiraa on kilpaillut vesipelastuksen SM-kisoissa. Kaikki vesipelastuksessa kilpailleet koirat vuoteen 2015 asti ovat olleet uroksia, jotka ovat lajiin suurempikokoisia ja vahvempia. Australiankarjakoiran sinnikkyys ja hyvä taistelutahto ja monipuolinen koulutettavuus tekevät siitä vartenotettavan vaikkakin harvinaisemman harrastuskaverin myös vesipelastusharrastukseen.

RALLYTOKO

Rally-toko on 2000-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa kehitetty laji, joka yhdistää elementtejä tokosta, agilitystä ja koiratanssista. Siinä tärkeintä on ohjaajan ja koiran iloinen yhteistyö, ei niinkään seuraamisen pilkuntarkka paikka tai asennon millintarkka suoruus. Koiraa saa ohjata sekä suullisin käskyin että käsimerkein ja kannustaa koko suorituksen ajan. Rally-toko kehitettiin siis aivan tavallisia koiranomistajia ajatellen ja sen päätavoitteena onkin saada aikaan koiria, jotka on koulutettu käyttäytymään hyvin kotona, yleisillä paikoilla sekä muiden koirien läheisyydessä.

Rally-tokossa suoritetaan rata, joka koostuu erilaisista tehtäväkylistä. Kylttejä on radalla 10–20 kpl 3-5 metrin välein. Koirakko etenee radalla perusseuraamisessa ja suorittaa kullakin kyltillä siinä määrätyn tehtävän. Tehtävät ovat esimerkiksi erilaisia suunnan- ja vauhdin muutoksia, pujottelua, pyörähdyksiä, peruuttamista, puolenvaihtoja, erilaisia asentoja ja niiden vaihtoja. Radalla voi olla myös hyppy tai putki sekä nami- tai leluhoukutus. Radan pituus ja liikkeiden vaativuus kasvaa luokasta toiseen siirryttäessä.

Rally-tokossa on neljä luokkaa: alokas- (ALO), avoin- (AVO), voittaja- (VOI) ja mestariluokka (MES).

Näistä alokasluokka suoritetaan taluttimessa ja muissa luokissa koira suorittaa radan vapaana.

Koirakon saavutettua luokassaan kolme vähintään 70 pisteen hyväksyttyä tulosta, on sen siirryttävä seuraavaan tasoluokkaan. Kolmesta hyväksytystä tuloksesta luokassaan koirakolle myönnetään koulutustunnus RTK1-4. Hyväksytty tulos on vähintään 70 pistettä maksimipisteiden ollessa kaikissa

luokissa 100 p.

Rallytokosta tuli Kennelliiton alainen virallinen kilpailulaji 1.5.2014. Laji on saavuttanut nopeasti suosiota myös australiankarjakoiraharrastajien keskuudessa. Ensimmäisen vuoden aikana koekäyntejä rodulla oli 17 kappaletta, ja vuonna 2015 käyntimäärät lähes tuplaantui.

Taulukko 24 RALLYTOKON KILPAILUKÄYNNIT JA TULOKSET VUOSINA 2014-2015

	HYVÄKSYTYT TULOKSET	HYLÄTYT TULOKSET	YHTEENSÄ
ALOKASLUOKKA	15	6	21
AVOIN LUOKKA	9	0	9
VOITTAJALUOKKA	6	3	9
MESTARILUOKKA	14	5	11
YHTEENSÄ	44	14	58

11 Eri koiraa on kilpaillut rallytokossa. Mestariluokassa kilpailleita koiria on kaksi, ja eniten hyväksytyjä mestariluokan suorituksia tehnyt koiraa on Worrigal Copperkalgorlie, joka saavutti vuonna 2016 epävirallisen rally-tokomestarin tittelin. Tittelin myöntää Suomen Rally-Tokoyhdistys koiralle, jolla on valioitumiseen vaadittavat tulokset lajista, mutta ei sekarotuisuuden tai puuttuvan näyttelytuloksen vuoksi voi virallisesti valioitua. Rallytokovalioita rodussa ei vielä ole. Koiralle, joka on saavuttanut kolme vähintään 95 pisteen tulosta kahdelta eri tuomarilta rally-tokon mestariluokassa, ja on yli 15 kk ikäisenä saavuttanut näyttelytuloksen vähintään laatumaininnalla ”hyvä”, voidaan anoa Kennelliiton rally-tokovalion (RTVA) arvoa.

Rallytoko soveltuu hyvin harrastukseksi australiankarjakoirille nopeatempoisuutensa ja monipuolisten ja koiralle hauskojen tehtävien vuoksi. Lisäksi laji sopii hyvin myös vanhemmille koirille, joille muut viralliset lajit ovat esimerkiksi fyysisesti liian vaativia.

METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTYSKOE

Metsästyskoirien jäljestämiskoe on alunperin tehty nimenomaan metsästyskoiraroduille. Tarkoitus on selvittää koiran kykyä seurata mahdollisesti haavoittuneen riistaeläimen jälkeä. Tätä ominaisuutta tarvittiin sekä kolari- että metsästystilanteissa. Laji saavutti niin suuren suosion, että se avattiin kaikille

roduille vuonna 2007.

Australiankarjakoiria on kilpaillut metsästyskoirien jäljestämiskokeessa kaksi kappaletta, ja rodussa on yksi jäljestämisvalio, vuonna 2012 valioitunut Erkkertin Red Ranger. Laji ei ole australiankarjakoiralle rodunomainen, sillä australiankarjakoiraa ei ole kehitetty metsästyskäyttöön, mutta lajissa menestyminen kertoo rodun monipuolisuudesta harrastuskoirana.

4.3.4. Näyttelyt ja jalostustarkastukset

KOIRANÄYTTELYT

Koiranäyttelyt perimmäinen tarkoitus on palvella koirien jalostus- ja kasvatustyötä. Näyttelyihin voivat osallistua puhtasrotuiset rekisteröidyt ja tunnistusmerkityt koirat. Näyttelyssä tuomari arvioi koiran rakennetta ja liikkeitä verraten sitä rodun rotumääritelmään ja antaa kirjallisen arvostelun siitä, kuinka kyseinen yksilö tuomarin mielestä vastaa rotumääritelmää.

Tuomarin antaman laatuarvostelun tulee vastata seuraavia määritelmiä:

ERINOMAINEN voidaan antaa koiralle, joka on hyvin lähellä rotumääritelmän ihannetta, joka esitetään erinomaisessa kunnossa, jolla tasapainoinen luonne, joka on korkealuokkainen ja joka on olemukseltaan erinomainen. Sen ulkomuodolliset ansiot ovat suuret ja virheet vähäiset ja sen tulee omata sukupuolelleen tyypilliset piirteet.

ERITTÄIN HYVÄ voidaan antaa koiralle, joka omaa rodulle tyypilliset piirteet, jolla on tasapainoinen rakenne, ja joka on hyvässä kunnossa. Muutama vähäinen virhe voidaan sallia, mutta ei rakenteellisia virheitä. Tämä laatumaininta voidaan antaa vain tasokkaalle koiralle.

HYVÄ annetaan koiralle, joka on rodulle tyypillinen, mutta sillä on selkeitä virheitä.

TYDYTTÄVÄ tulee antaa koiralle, joka vastaa rotuaan ilman yleisesti hyväksytyjä rodun piirteitä, tai jonka fyysisessä kunnossa on toivomisen varaa.

HYLÄTTY tulee antaa koiralle, joka ei rakenteeltaan vastaa rotumääritelmää, jonka käytös ei ole rotumääritelmän mukainen tai se on selvästi vihainen, jolla on sääntöjen vastainen kivespuutos,

hammaspuutoksia tai poikkeavuutta purennassa tai leuoissa, jonka väritys tai karvapeite on puutteellinen tai joka osoittaa selvästi merkkejä albinismista. Tämä laatumaininta voidaan antaa myös koiralle, joka ei vaikuta terveeltä. Sen lisäksi se voidaan antaa koiralle, jolla on rotumääritelmän vastainen hylkäävä virhe.

Koirat, joille ei voida antaa mitään edellä mainituista laatumaininnoista poistetaan kehästä maininnalla: EI VOIDA ARVOSTELLA Tämä maininta annetaan koiralle, joka ei liiku, hyppii jatkuvasti esittäjänsä ympärillä tai pyrkii ulos kehästä, jonka liikkeitä on mahdoton arvostella tai jos koira jatkuvasti välttelee tuomarin käsittelyä ja tekee mahdottomaksi tarkastaa purenna ja hampaat, rakenteen, hännän tai kivekset, tai jos on havaittavissa jälkiä toimenpiteistä tai käsittelystä, jotka näyttävät vilpin yritykseltä tai tuomarilla on syytä epäillä, että koiralla olevaa vikaa on korjailtu (esim. silmäluomia, korvia tai häntää). Syy, miksi koira ei voida arvostella, on kirjattava arvosteluun.

Taulukko 25 AUSTRALIANKARJAKOIREN LAATUARVOSTELUT 2005-2015

	ERI	EH	H	T	EVA	HYL	
Junioriluokka	352	223	57	6	8	4	650
Nuorten luokka	223	133	47	6	1	3	413
Avoin luokka	409	209	75	6	3	5	707
Käyttöluokka	2	2	0	0	0	0	4
Valioluokka	610	74	9	1	1	3	698
Veteraaniluokka	382	65	8	0	1	0	456
Yhteensä	1978	706	196	19	14	15	2928

Näyttelyt ovat suosituin harrastusmuoto australiankarjakoirilla. Yli puolet kaikista rekisteröidyistä australiankarjakoirista on käynyt vähintään kerran näyttelyssä elämänsä aikana. Suomalaiset australiankarjakoirat vastaavat pääsääntöisesti rotumääritelmää erinomaisesti ja Suomessa jalostetut australiankarjakoirat ovat ulkomuodollisesti laadukkaita. Australiankarjakoiran jalostuksessa ulkonäkö ei saa olla ensisijaisessa asemassa, mutta työkoiraksi soveltuva rakenne on rodulle tärkeä.

JALOSTUSTARKASTUKSET

Kennelliiton kehittämä jalostustarkastus on tarkoitettu rotujärjestöille työkaluksi, jolla voidaan kerätä yksityiskohtaista ja vertailukelpoista tietoa koirien ominaisuuksista. Tarkastus sisältää ulkomuoto- ja käyttäytymisosiön, jotka voidaan suorittaa samalla kertaa, erikseen tai vain toisen osa-alueen osalta. Tarkastusten järjestämisestä vastaavat rotujärjestöt ja niiden alaiset yhdistykset. Tieto tarkastuksesta tullaan kirjaamaan jalostustietojärjestelmään koiran tietoihin. Jalostustarkastuksen ohjeet astuivat voimaan 1.6.2015. Jalostustarkastuksia ei ole vielä järjestetty australiankarjakoirille.

4.3.5 Kotikäyttäytyminen ja lisääntyminen

Yksinoloon liittyvät ongelmat

Yksinoloon liittyvillä ongelmilla tarkoitetaan ei-toivottua käyttäytymistä kun koira jää kotiin yksin, joskus ilmiötä kutsutaan myös eroahdistukseksi. Eroahdistunut koira saattaa yksinollessaan haukkua tai ulvoa omistajansa perään, vaeltaa levottomasti edestakaisin ympäri asuntoa, tuhota omaisuutta, ulostaa aikuisenakin sisälle. Eroahdistusta esiintyy suurimmalla osalla roduista mutta siitä kärsivien yksilöiden määrä vaihtelee. Eroahdistus voi olla merkki koiran huonosta hermorakenteesta, mutta se voi olla myös opittu toimintamalli tai tapa purkaa patoutunutta energiaa.

Australiankarjakoirille eroahdistus ei ole tyypillinen ongelma, vaikka yksittäisillä yksilöillä sitä saattaa esiintyä. Yksinolo voi olla haastavinta etenkin nuorilla, energisillä koirilla, jotka yksin ollessaan saattavat pureskella rikki omaisuutta tylsistyneinä. Yksinoloon liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyssä avainasemassa ovat selkeät rutiinit, asian opettelu pennusta lähti en sekä riittävän liikunnan ja aivotyöskentelyn tarjoaminen koiralle. Jalostuksellisesti asia tulee ottaa huomioon suosimalla arjessa tasapainoisesti käyttäytyviä koiria.

Lisääntymiskäyttäytyminen

Australiankarjakoira on yleensä normaalin sukupuolivietin omaava rotu, jonka lisääntymiskäyttäytymisessä on harvoin ongelmallisia piirteitä. Yliseksuaalisuus ei ole rodulla yleistä.

Sosiaalinen käyttäytyminen

Australiankarjakoiran sosiaaliselle käyttäytymiselle on tyypillistä se, että ne ovat tarkkoja omasta laumastaan. Ne ovat tuttuja ihmisiä ja tuttuja koiria kohtaan sosiaalisempia kuin ventovieraita. Omassa laumassa australiankarjakoira tulee yleensä toimeen toisten koirien kanssa, etenkin jos koirilla on selkeä järjestys ja riittävä ikäero. Ns. koirapuistokoira australiankarjakoira ei ole, eikä usein aikuisena tule toimeen samaa sukupuolta olevien vieraiden koirien kanssa. Uroksilla piirre esiintyy usein narttuja voimakkaampana. Kuten muissakin käyttäytymisen pulmissa, myös sosiaalisen käyttäytymisen ongelmia voivat aiheuttaa liian vähäinen aktiviteetti tai terveydelliset ongelmat.

Pelot ja ääniherkkyys

Kuten luonnetestitilastoista selviää, australiankarjakoirilla esiintyy ääniherkkyttä ja laukausalttiutta. Ääniherkkyksien ominaispiirre on, että ne usein pahenevat iän myötä koiran pelon yleistyessä. Voimakas ääniherkkyys voi tehdä koiran elämästä erittäin hankalaa, ja siksi tällaisia koiria ei tulisi käyttää jalostukseen. Pahat, herkästi yleistyvät äänipelot eivät ole rodulla kovin yleisiä, ja esimerkiksi luonnetestissä laukauskokemattomista koirista suurin osa ei reagoi arjessa koviin ääniin millään tavoin.

Australiankarjakoirilla toispuoleinen kuurous on melko yleistä ja voi joillain yksilöillä aiheuttaa reagointia yllättäviin ääniin. Koira saattaa esimerkiksi yrittää paikallistaa äänen suuntaa, tai säpsähtää yllättävää ääntä jonka suunnasta sillä ei ole tietoa. Rodussa on luonnetestattu useita puolikuuria koiria laukausvarmoiksi, joten toispuoleisesti kuulevan koiran äänipelot eivät ole selitettävissä pelkällä aistivammalla, vaan sen taustalla on usein perinnöllistä ääniherkkyttä.

Ylipäättään erilaiset pelkotilat eivät ole rodulle tyypillisiä, ja ne ovat hyvin ei-toivottuja. Pelokasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Ääniherkkyksien tiedetään etenkin olevan voimakkaasti perinnöllisiä, ja niihin tulee suhtautua vakavasti.

Ikään liittyvät käytöshäiriöt

Australiankarjakoirilla ikään liittyvät käytöshäiriöt johtuvat usein terveydellisistä syistä. Vanhoilla koirilla aistit kuten näkö ja kuulo voivat alkaa heiketä ja koira voi muuttua epävarmemmaksi. Lisäksi erilaiset nivelrikkomuutokset tai muu kipua aiheuttava sairaus on usein syynä jos vanhemman koiran

käytös alkaa muuttumaan ongelmalliseksi.

Rakenteelliset tai terveydelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen

Merkittävimmät rodun sairaudet jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen:

- NCL
- Kuurous
- Lonkka- ja kyynärniveldysplasia
- Spondyloosi tai muu selkävika
- Sokeutta ja/tai kipua aiheuttavat silmäsairaudet (HC, PRA, PLL)

4.3.6. Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä niiden korjaamisesta

Keskeisimmät ongelmakohdat

Keskeisimpiä käyttäytymisen ja luonteen ongelmakohtia australiankarjakoiralla ovat:

- Luonne- ja käyttäytymishäiriöiden takia lopetettujen nuorien koirien määrä
- Alkuperäisen työhön kykenevien koirien väheneminen
- Koirien myyminen niille soveltumattomiin koteihin
- Liian pieni toimintakyky
- Vähäinen taistelutahto
- Liiallinen pehmeys
- Luonnetestissä hylättyjen koirien suuri määrä (19 %)
- Harrastuskoirien ja harrastuskoekäyntien vähyys

Ongelmien syyt ja vähentäminen

Australiankarjakoiran luonne on ainutlaatuinen, vaalittava ominaisuus joka asettaa kasvattajat monen haasteen eteen. Rodunomainen karjakoira voi olla vaikea koira kokemattomalle omistajalle ja niiden toiminnantarve voi tulla yllätyksenä. Mikäli vääränlaiseen kotiin sattuu rodun haastava yksilö,

vaaditaan paljon tukea ja halua paneutua koiran kouluttamiseen, jotta ongelmilta vältytään. Valistus, kotien huolellinen valinta ja tuki ovat kuitenkin ensisijaisen tärkeitä että käyttäytymisongelmien vuoksi lopetettujen koirien määrä vähenisi.

Alkuperäiseen työhön kykenevien koirien määrän vähyys on uhka rodulle, sillä alkuperäinen työkäyttö ja sen vaatimukset koiran henkisille ominaisuuksille ja fysiikalle eivät enää ohjaa jalostusta. Vaarana on että yhä harvempi koira kykenee alkuperäiseen työhön ja ylipäättään kiinnostus australiankarjakoiran käyttöön paimenkoirana vähenee. Yhdistys pyrkii pitämään yllä kiinnostusta koirien paimennuskäyttöön esimerkiksi paimennuspäivän kautta ja muutenkin nostamalla rotua esiin myös monipuolisena paimenkoirana.

Luonnetestissä hylättyjen koirien suuri määrä, pienen toimintakyvyn, puutteellisen taisteluhalun ja liiallisen pehmeiden esilletulo on tärkeää. Ei ole rodun edun mukaista että nämä ongelmat jäisivät piiloon, ja koiria luonnetestattaisiin vähemmän. Jalostuksesta ei voida rajata pois jokaista epätäydellistä yksilöä, joten on tärkeä katsoa kokonaisuutta, ja pyrkiä yhdistämään sellaiset koirat keskenään, joilla mahdolliset luonteen heikkoudet eivät kertaannu – ja mikäli valittavana on kaksi muuten samanarvoista koiraa jalostukseen, tulisi parempaa toimintakykyä, taisteluhalua ja vähäisempää pehmeyttä ilmentävää koiraa käyttää.

Rodun rekisteröintimäärät ovat pieniä ja harrastajamäärät ovat pieniä joka lajissa. Harrastuskoekäynnit antavat koirista sellaista tietoa, jota ei ole saatavilla luonnetestimenetelmin, ja harrastukseen kykenevien koirien määrän väheneminen olisi rodun kannalta suuri menetys. Lukumääräisestä vähydestä huolimatta karjakoirat ovat menestyneet monissa lajeissa erinomaisesti. Mikäli harrastajien kiinnostus rotuun vähenee, ei koirien jalostuksessa harrastusominaisuuksia oteta enää samalla tavalla huomioon. Tämä voi muuttaa koirien luonteista sellaiseen suuntaan, että harrastuksen mahdollistavat ominaisuudet vähenevät. Toinen haaste on, että jos rotua ei harrastuskentillä näy, ei uusia harrastajia tule rodun pariin. Aktiiviharrastajat jotka tuovat rotua esille ovat tärkeitä rodun maineelle. Eri lajeissa järjestetyt rodun mestaruuskokeet, vuoden koira –kilpailut ja karjisleirit pyrkivät saamaan karjakoiranomistajia osallistumaan virallisiin kokeisiin ja kisoihin.

4.4. Terveys ja lisääntyminen

4.4.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet

4.4.1.1. PEVISA-ohjelman voimaantulovuosi sekä ohjelman muutokset

Australiankarjakoiralla on voimassa seuraava rotukohtainen, 17.3.2013 vuosikokouksessa hyväksytty PEVISA-ohjelma:

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D ja kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätutkimuslausunto ei saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Ohjelma on voimassa rotujärjestön anomuksen mukaisesti 31.12.2013 saakka ja jalostustieteellisen toimikunnan kokouksen 10/11 päätöksen mukaisesti sitä voidaan sen jälkeen rotujärjestön esityksestä jatkaa JTO:n voimassaolokauden loppuun.

Rotujärjestö Suomen Palveluskoiraliitto ry esitti ja hyväksyi kevätkokouksensa 27.4.2013 päätöksellä ohjelman jatkamista 31.12.2016 asti.

Uudesta PEVISA-ohjelmasta äänestettiin vuosikokouksessa 2016. Esitys hyväksyttiin.

Suomen australiankarjakoirat ry:n hallituksen ja jalostustoimikunnan yhteinen esitys Pevisa-ohjelmaksi 1.1.2017 alkaen:

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D ja kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätutkimuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla virallinen selän spondyloosilausunto ennen koiran toista (2.) pentuetta. Mikäli koiralla on ennen ensimmäistä (1.) pentuetta virallinen lausunto selän spondyloosista, ei selkää tarvitse kuvata uudelleen. Rekisteröinnin raja-arvoa ei ole, tutkimuspakko.

4.4.1.2. Lonkkanivelen kasvuhäiriö

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston ja nivelten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat syntymähetkellä silmämääräisesti normaalit, mutta muutokset alkavat jo pennun ensimmäisten elinviikkojen aikana.

Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään kontaktiin. Alueelle kohdistuu epänormaalin suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi kontaktialue on. Tämä voi johtaa mikromurtumiin ja lonkkamaljan mataloitumiseen. Noin vuoden iässä lantion luutuminen on täydellistä ja yleensä kipukin helpottaa tässä iässä.

Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa usein nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja tyyppiin vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Myös ympäristöllä on vaikutusta lonkkavian ilmenemiseen ja vaikeusasteeseen.

Lonkkanivelen kasvuhäiriötä tavataan lähes kaikilla roduilla, mutta yleisintä se on suurilla ja jättiroduilla. Oireet voidaan huomata pentuna 3-12 kuukauden iässä, jolloin kipu johtuu löysyyden aiheuttamasta nivelkapselin tulehduksesta tai luukalvon hermojen jännityksestä ja repeämisestä. Nuorilla koirilla oireina voivat olla takajalkojen ontuminen, ”pupuhyppely”, ylösnousuvaikeudet levon jälkeen, liikkumishaluttomuus ja nakshteleva ääni kävellessä. Oireet voivat alkaa äkillisesti ja omistaja voi liittää ne johonkin tapaturmaan. Oireet voivat vähentyä selvästi tai loppua kokonaan jopa useiksi vuosiksi, kun nivelen ympärille muodostuva sidekudos vähentää nivelen löysyyttä.

Toinen oireilevien koirien ryhmä on aikuiset koirat, joiden oireiden synnä on nivelrikko. Vanhemmilla nivelrikkoisilla koirilla oireet voivat olla epämääräisiä ja oireilu laitetaankin usein vanhenemisen piikkiin. Tyypillisiä oireita ovat takajalkojen ontuminen ja jäykkyys liikkeessä. Lonkkavikainen koira

yrittää viedä painoa pois takaosalta, mikä ilmenee kävellessä selkälinjan aaltoiluna ja lantion kiertymisenä. Tämä johtaa myös takaosan lihaskatoon ja etupään lihasten voimistumiseen.

Lonkkanivelen kasvuhäiriön ja siitä johtuvan nivelrikon hoidossa on ruokinnalla keskeinen merkitys. Ylipaino pahentaa oireita ja pelkkä painon pudotus voi helpottaa koiran oloa. Tulehduskipulääkkeitä ja pistoksena tai suun kautta annettavia nivelnesteiden ja nivelruston koostumusta parantavia aineita käytetään yleisesti. Sopiva liikunta pitää lihaksiston kunnossa ja nivelet liikkuvina. Kirurgisia hoitoja on myös olemassa.

Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu useimmilla roduilla lonkkien röntgenkuvaukseen.

Lonkkanivelen kasvuhäiriön periytyvyys on kohtuullinen. Ilmiasuunkin perustuvan jalostusvalinnan pitäisi johtaa tuloksiin, jos valinta on systemaattista eikä lonkkavikaisia koiria käytetä.

Jalostusarvoindeksien (BLUP-indeksit) avulla valinta on tehokkaampaa. Indeksissä otetaan huomioon koiran kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan röntgentuloksiin vaikuttavien ympäristötekijöiden vaikutusta. Jalostusindeksejä lasketaan jo useille roduille sekä lonkka- että kyynärnivelistä. Indeksien laskemisen edellytyksenä on riittävä määrä kuvattuja koiria.

Taulukko 26 LONKKANIVELTULOKSET 2005-2015 SYNTYNEISTÄ

Vuosi	Syntyneitä	A	B	C	D	E	Yhteensä
2005	49	3	7	12	1	0	23
2006	36	3	6	11	1	0	21
2007	28	3	3	8	4	0	18
2008	34	5	6	8	3	0	22
2009	35	3	6	7	0	0	16
2010	36	3	7	9	2	1	22
2011	32	2	3	8	4	0	17
2012	36	7	4	8	1	0	20
2013	29	0	8	5	2	0	15
2014	13	0	0	1	1	0	2
2015	26	0	6	6	2	0	14
Yhteensä	354	29	50	77	19	1	176

Taulukko 27 LONKKANIVELDYSPLASIAN ARVOSTELUASTEIKKO

Suomessa käytetään FCI:n vahvistamaa kansainvälistä lonkkaniveldysplasian arvosteluasteikkoa:

A ei muutoksia	Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset. Lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna piirtyy terävänä ja on lievästi pyöristynyt. Nivelrako on tiivis ja tasainen. Norbergin asteikko vetoasennossa noin 105° (suosituksena).
B lähes normaali / rajatapaus	Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat vähän epäyhdenmukaiset ja Norbergin asteikko vetoasennossa lähellä 105°, tai reisiluun pään keskus on mediaalisesti lonkkamaljakon dorsaalireunaan nähden ja reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset.
C lievä	Reisiluun pää ja lonkkamalja eivät ole yhdenmukaiset, Norbergin asteikko on noin 100° ja/tai lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna on vähän mataloitunut. Epätasaisuutta tai korkeintaan lieviä nivelrikkomuutoksia lonkkamaljan kraniaali-, kaudaali- tai dorsaalireunassa tai reisiluun päässä tai kaulassa.
D kohtalainen (keskivaikea)	Selvää epätasaisuutta reisiluun päässä ja lonkkamaljakossa, subluksatio. Norbergin asteikko on suurempi kuin 90° (vain suosituksena). Lonkkamaljakon kraniolateraalireuna tasaantunut ja/tai nivelrikon merkkejä.
E vaikea	Selvästi dysplastinen lonkkanivel. Esim. luksatio tai selvä subluksatio, Nordbergin asteikko alle 90°, selvä lonkkamaljakon kraniaalireunan tasaantuminen, reisiluun pään epämuotoisuus (sienimäinen, tasaantunut) tai muut nivelrikkomuutokset.

Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 6 vuoden ikään saakka. Tämän jälkeen arvostelussa on otettava huomioon koiran ikä ja erityisesti sekundäärinivelrikko.

Kaavio 2 LONKKANIVELTULOKSET, LAUSUNTOVUOSI 2000-2015



Australiankarjakoirilla ei ole käytössä BLUP-indeksejä auttamaan lonkkavian vastustamisessa jalostuksessa. Suomessa lonkkia on tutkittu jalostuskoirilta pitkään ja jalostusvalinnoilla D ja E – lonkkaisten koirien määrää on saatu vähennettyä. C-lonkkaisuus on suomalaisilla australiankarjakoirilla edelleen yleistä, suurin osa näistä koirista elää koko elämänsä oireilematta lonkkiaan. Jalostuksessa tulisi kuitenkin edelleen pyrkiä parantamaan lonkkien terveyttä. D-lonkkaisten käyttöä jalostuksessa ei suositella ja C-lonkkaisen koiran kumppaniksi tulisi valita tervelonkkainen yksilö. PEVISA-ohjelman raja-arvo jalostukseen käytettävän koiran lonkkaniveldysplasian aste on D.

4.4.1.3. Kyynärnivelen kasvuhäiriö

Kyynärnivelen kasvuhäiriö (engl. elbow dysplasia, ED) on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja. Kyynärnivelen kasvuhäiriön eri muotoja ovat varislisäkkeen (processus coronoideus) sisemmän osan sairaus, olkaluun nivelnastan (condylus humeralis) sisemmän osan osteokondroosi ja kiinnittymätön kyynärpään uloke (processus anconaeus). Kyynärnivelen inkongruenssia (nivelpintojen epäyhdenmukaisuutta) pidetään tärkeänä syynä kaikkiin edellä mainittuihin kasvuhäiriöihin ja myös se lasketaan kyynärnivelen kasvuhäiriöksi.

Kyynärnivelen kasvuhäiriön periytyminen on kvantitatiivista eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Kasvuhäiriön tyyppi vaihtelee eriroduilla, mikä viittaa siihen että aiheuttajina ovat eri geenit. Kyynärnivelen kasvuhäiriö on yleisempää uroksilla todennäköisesti urosten suuremman painon ja mahdollisesti myös hormonaalisten tekijöiden takia. Nykykäsityksen mukaan perinnöllisillä tekijöillä on

suurin osuus kyynärnivelen kasvuhäiriön synnyssä, mutta ympäristötekijöillä on osuutensa sen ilmenemisessä.

Kaikissa kyynärnivelen kasvuhäiriöissä oireet alkavat keskimäärin 4 – 7 kuukauden iässä. Tyypillinen oire on ontuminen, joka voi pahentua rasituksessa tai olla voimakkainta levon jälkeen. Ontuminen voi olla jatkuvaa tai ajoittaista. Omistajan voi olla vaikea havaita koiran ontumista, jos kasvuhäiriö on molemminpuolinen. Toisinaan kasvuhäiriö on molemmissa kyynärnivelistä, vaikka koira ontuu vain toista jalkaa. Usein oireet huomataan vasta aikuisiällä ja silloin oireet johtuvat kasvuhäiriön seurauksena kehittyneestä nivelrikosta. Kiinnittymätön kyynärpään uloke ei välttämättä oireile nuorella koiralla ja se voi olla röntgenkuvauksen sivulöydös.

Kasvuhäiriöiden ja niiden erilaisten kirurgisten hoitojen tehosta ja pitkäaikaisennusteesta ei ole olemassa kattavia tutkimuksia. Leikkaushoidon hyöty on epävarma, jos nivelessä on jo selvät nivelrikon merkit. Kaikkien kyynärnivelen kasvuhäiriöiden seurauksena on ainakin hoitamattomana yleensä nivelrikko. Leikattuunkin jalkaan kehittyy usein jonkin asteinen nivelrikko, mutta sen määrä voi olla vähäisempää ja se voi kehittyä myöhemmin kuin ilman leikkausta hoidetussa nivelessä. Kyynärnivelen nivelrikko invalidisoi koiraa yleensä pahemmin kuin esim. lonkkien nivelrikko, koska koiran painosta noin 60 % on etuosalla. Nivelrikon hoidossa tärkeitä ovat painon pudotus, liikunnan rajoitus ja tarvittaessa käytetään myös tulehduskipulääkkeitä. Lisäksi voidaan käyttää nivelnesteeseen koostumusta parantavia lääkkeitä ja ravintolisiä.

Suomessa kyynärnivelnäkökuvien arviointi perustuu pääasiassa nivelrikon merkkeihin, mutta myös muut kasvuhäiriöön viittaavat röntgenlöydökset huomioidaan. Jalostusarvoindeksit (BLUP-indeksit) tehostavat jalostusvalintaa. Indeksissä otetaan huomioon koiran oman tuloksen lisäksi sen kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan röntgentuloksiin vaikuttavien ympäristötekijöiden vaikutusta. Jalostusindeksejä lasketaan jo useille roduille sekä lonkka- että kyynärnivelistä. Indeksien laskemisen edellytyksenä on riittävä määrä kuvattuja koiria.

Suomessa arvostelussa käytetään I EWG:n esittämää kansainvälistä kyynärniveldysplasian arvosteluasteikkoa.

Taulukko 28 KYYNÄRNIVELDYSPLASIAN ARVOSTELUASTEIKKO

0	Ei muutoksia.
1 lievät muutokset	Lievät nivelrikkomuutokset (artroosi) yleensä ensiksi kyynärpään ulokkeen (processus anconaeus) yläpinnassa (2 mm vahvuuteen saakka).
2 kohtalaiset muutokset	Edellä mainittuja muutoksia 5 mm saakka ja/tai muutoksia varttinäluun nivelosassa, varisliäkkeessä (processus coronoideus) ja/tai lievää epämuotoisuutta.
3 voimakkaat muutokset	Edellisen ylittävät rappeutumismuutokset/voimakas epämuotoisuus. Kiinnittymätön processus anconaeus.

Taulukko 29 KYYNÄRNIVELTULOKSET SYNTYMÄVUOSI 2005-2015

Vuosi	Syntyneitä	0	1	2	3	Yhteensä
2005	49	18	4	1	0	23
2006	36	19	2	0	0	21
2007	28	15	2	1	0	18
2008	34	18	3	1	0	22
2009	35	14	1	1	0	16
2010	36	16	2	2	0	20
2011	32	16	1	0	0	17
2012	36	17	3	0	0	20
2013	29	13	1	0	0	14
2014	13	2	0	0	0	2
2015	26	0	0	0	0	0
Yhteensä	354	148	19	6	0	173

Kaavio 3 KYYNÄRNIVELTULOKSET, LAUSUNTOVUOSI 2000-2015



Australiankarjakoirilla ei ole käytettävissä BLUP-indeksejä kynärniveldysplasian vastustamiseksi jalostuksessa. Kynärien tutkiminen suomalaisilla australiankarjakoirilla alkoi hieman lonkkia myöhemmin. Pääsääntöisesti koirien kynärien terveys on hyvä. Kynärniveldysplasia aiheuttaa australiankarjakoiralle enemmän oireita kuin esimerkiksi C-lonkkaisuus. Koska australiankarjakoira on vahva ja helposti aavistuksen etupainoinen, joutuvat koiran kynärät myös suuremman rasituksen alle. Kynärnivelen dysplasian aiheuttama nivelrikko aiheuttaa hoitamattomana koirille kipua ja ontumista. Vakavat kynärviat voivat estää koiran harrastus- ja työkäytön. Jalostuksessa tulisi käyttää vain kynäriltään terveitä yksilöitä. Australiankarjakoirien PEVISA-ohjelman raja-arvo on kynärniveldysplasia aste 1.

4.4.1.4. Silmäsairaudet

PRA (Progressive Retinal Atrophy, etenevä verkkokalvon surkastuma)

PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. Kyseessä on ryhmä sairauksia, jotka ovat eri geenien aiheuttamia. PRA:ta on montaa tyyppiä, eri rotujen PRA:t ovat erilaisia ja jopa samassa rodussa voi olla useita eri muotoja. PRA on löydetty yli 100 rodulla ja näistä ainakin 22:lla mutaatio on voitu paikallistaa. Se voi esiintyä millä tahansa rodulla. Yleisin periytymismekanismi on autosomaalinen resessiivinen.

Kliinisten oireiden ilmenemisikä ja eteneminen vaihtelevat liittyen PRA-muodon syntymekanismiin. Hyvin nuorella koiralla esiintyvä PRA:n muoto liittyy vääränlaiseen näköhermosolujen kehitykseen. Myöhemmällä iällä alkavassa PRA:ssa sen sijaan näköhermosolut kehittyvät normaalisti, mutta alkavat

rappeutua. Useimmissa PRA:n muodoissa koira muuttuu ensin hämärässä epävarmaksi ja pelokkaaksi. Tämä johtuu hämäränäössä tärkeiden verkkokalvon sauvasolujen surkastumisesta. Myöhemmin koira sokeutuu kokonaan verkkokalvon tappisolujen surkastuessa. Silmäterä on laaja ja silmänpohjan lisääntynyt heijaste näkyy erityisen selvästi valon kohdistuessa laajentuneeseen mustuaiseen.

PRA:han ei ole hoitoa, mutta tutussa ympäristössä sokeakin koira voi pärjätä erittäin hyvin. Kokeellisesti koirille on käytetty geeniterapiaa näköhermosolujen perinnöllisessä sairaudessa, jossa periyttävä geeni on tunnettu. Diagnoosi tehdään yleensä silmänpohjan oftalmoskooppisessa tutkimuksessa. Verkkokalvon sähköisessä tutkimuksessa (ERG) voidaan havaita muutoksia näköhermosoluissa jo ennen oftalmoskooppisessa tutkimuksessa nähtäviä selviä verkkokalvon rappeutumamuutoksia.

Suomessa 4 koiralla on todettu virallisessa silmätutkimuksessa PRA. Lähes kaikki jalostuskoirat ovat geenitestattu PRA:n osalta tai niiden status on vanhempien perusteella tiedossa ja sairaiden koirien syntymistä on helppo välttää.

Perinnöllinen harmaakaihi eli hereditäärinen katarakta (hereditary cataract, HC)

Perinnöllinen harmaakaihi eli hereditäärinen katarakta samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan. Tunnettujen muotojen periytymismekanismi on yleensä autosomaalinen resessiivinen, mutta useimpien muotojen periytymismallia ei tiedetä. Sairauden alkamisikä vaihtelee suuresti. Perinnöllinen kaihi on yleensä molemminpuolinen ja johtaa sokeuteen, jos linssien samentuminen on täydellinen. Jos kaihisamentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koiran näkökykyyn. Katarakta eli kaihi voi olla perinnöllinen tai ei perinnöllinen, synnynnäinen tai hankittu. Syntymän ja 8 viikon iän välillä todetut kataraktat ovat synnynnäisiä. Esimerkkinä hankitusta kataraktasta voidaan mainita sokeritautiin liittyvä, hyvin nopeasti täydelliseksi kaihiksi kehittyvä katarakta.

Muita esimerkkejä hankitusta kaihista ovat esimerkiksi vanhuuden kaihi ja PRA:han liittyvä toissijainen kaihi. Ns. nukleaariskleroosi eli linssin kovettuminen vanhalla koiralla ei ole varsinainen kaihimuutos, vaan normaaliin ikääntymiseen liittyvä muutos, jossa linssin ydin muuttuu 'opaalinharmaaksi'. Näkökykyyn se ei vaikuta. Perinnöllinen kaihi voidaan todeta perinnöllisten silmänsairauksien varalta tehtävässä silmätutkimuksessa. Erityisen tärkeää kaihin toteamisessa on viralliseen silmätutkimukseen kuuluva biomikroskooppitutkimus. Kaihi voidaan poistaa leikkauksella fakoemulsifikaatiomentelmällä. Paras leikkaustulos saadaan, kun leikkaus tehdään ennen kuin kaihimuutos on täydellinen. Hoidon

edellytyksenä on se, että silmänpohja on terve. Perinnöllinen katarakta voi esiintyä yhdessä PRA:n kanssa, yleensä PRA:han liittyy kuitenkin ns. toissijainen kaihi.

Taulukko 30 KAIHIN ESIINTYMINEN SUOMALAISILLA AUSTRALIAANKARJAKOIRILLA

Kaihin tyyppi	Sairaiden määrä
Poster polaarinen katarakta	8
Kortikaalinen katarakta	5
Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty	4
Nukleaarinen katarakta	1

4.4.2. Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet

4.4.2.1. Spondyloosi

Spondylosis deformans eli spondyloosi on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä ja/tai -silloja. Spondyloosia kehittyy usein normaalistikin ikääntymisen myötä, mutta rappeumaa voidaan todeta jo nuorilla koirilla. Spondyloosi on todettu perinnölliseksi sairaudeksi bokkereilla (perinnöllisyys 0,42–0,62), joten sitä voidaan vastustaa jalostusvalinnoilla.

Silloittumat ovat yleisimpiä rintarangan loppuosassa ja lannerangan sekä ristiselän alueella, joten rinta- ja lannerangasta otetut sivukuvat ovat riittäviä kartoituskuvaamisessa. Vanhalle koiralle sallitaan hieman enemmän muutoksia kuin saman lausunnon saavalle nuorelle koiralle, mutta eri-ikäisten koirien lausuntoja on vaikea verrata suoraan, koska ikääntymismuutosten osuutta on hankalaa arvioida. Kuitenkin kannattaa muistaa, että spondyloosi on etenevä sairaus, joten puhdas selkä tai vain lievät muutokset vanhemmalla koiralla on jalostuksellisesti erittäin merkittävä löydös.

Spondyloosia pidettiin pitkään koiralle merkityksettömänä oireettomana ikääntymismuutoksena. On kuitenkin havaittu, että selkärankaan muodostuneet luupiikit ja silloittumat voivat aiheuttaa koiralle vaihtelevanasteisia oireita kuten jäykkyyttä, ontumista, epämääräisiä selkäkipuja ja hyppämishaluttomuutta. Kehittymässä olevat luupiikit voivat murtua tai hangata toisiaan aiheuttaen tulehduskipua alueella – toisinaan paikalliset oireet helpottavat kun luutuminen etenee täydeksi sillaksi. Ventraalinen eli nikamien alapuolelle muodostuva siltamuodostus jäykistää selkää rasittaen viereisiä nikamavälejä. Harvinaisempi lateraalinen eli nikamien sivuille muodostuva spondyloosi voi painaa hermojuuria ja aiheuttaa koiralle rajujakin oireita, kuten virtsan ja ulosteen

pidätyskyvyttömyyttä tai halvausoireita. Tällaisen tilanteen diagnosointi vaatii useimmiten röntgenkuvauksen lisäksi tietokonetomografia (CT) tai magneetti (MRI) tutkimuksen. Spondyloosia sairastavien koirien oireilu vaihtelee voimakkaasti yksilöittäin ja jopa vaikeaa spondyloosia sairastava koira voi olla täysin oireeton, joten kartoituskuvaaminen on jalostuksellisesti tärkeää.

Taulukko 31 ARVOSTELUSSA KÄYTETTÄVÄ ASTEIKKO (1.6.2013 ALKAEN):

SP0, puhdas	Ei muutoksia
SP1, lievä	Todetaan < 3 mm piikkejä korkeintaan 4 nikamavälissä tai > 3 mm piikkejä korkeintaan 3 nikamavälissä tai saareke korkeintaan 2 nikamavälissä.
SP2, selkeä	Todetaan silloittuma (täysi tai vajaa) korkeintaan 2 nikamavälissä ja/tai suuria saarekkeita korkeintaan 2 nikamavälissä.
SP3, keskivaikea	Todetaan silloittumia (täysiä tai vajaita) ja/tai suuria saarekkeita 3–7 nikamavälissä.
SP4, vaikea	Edellisiä vakavammat muutokset

Lausunnossa otetaan huomioon kaikki rintanikamat (1–13) sekä lannenikamat (1–7) ja ristiluu. Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 5 ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen arvostelussa otetaan huomioon koiran ikä siten, että 5–7 vuotiaalla koiralla jätetään huomioimatta yksi silloittuma ja 8-vuotiaalla tai vanhemmalla koiralla jätetään huomioimatta kaksi silloittumaa. Kuitenkin jos vanhallakin koiralla on silloittumaa, ei se voi saada SP0 lausuntoa.

Spondyloosi on yleisin australiankarjakoirilla esiintyvä selkäsairaus. Sitä esiintyy laajasti niin Suomessa kuin muidenkin maiden populaatioissa. Kennelliitto aloitti virallisten spondyloosilausuntojen antamisen kaikille roduille vuonna 2012. Australiankarjakoirilla spondyloosin esiintyminen on yleisempää kuin monella muulla keskikokoisella paimenkoiralla.

Taulukko 32 SPONDYLOOSILAUSUNTOJEN VERTAILU RODUITTAIN, SYNTYMÄVUOSI 2000-2015

ROTU	TERVEEKSI LAUSUTTUIEN OSUUS LAUSUTUISTA	SPONDYLOOSISAIRAIDEN KOIRIEN OSUUS LAUSUTUISTA	LAUSUTTUIEN KOIRIEN OSUUS AIKAVÄLIN REKISTERÖINNEISTÄ
Australiankarjakoira	63%	37%	13%
Australiankelpie	100%	0%	5%
Australianpaimenkoira	91%	9%	3%
Bordercollie	95%	5%	2%
Belgianpaimenkoirat	88%	12%	6%
Bokseri	33%	67%	26%

Spondyloosi on australiankarjakoirilla yleisempää kuin muilla aktiivisilla keskikokoisilla paimenkoiraroduilla. Spondyloosin yleisyydessä australiankarjakoira on lähempänä bokseria kuin lähintä sukulaisrotuaan australiankelpiä. Näin suurien erojen taustalla ovat todennäköisesti perinnölliset tekijät.

Spondyloosin perinnöllisyydestä australiankarjakoirilla ei ole tutkimustietoa ja aineistoa selkien terveydestä on kerätty vasta hyvin vähän aikaa. Tänä aikana tehdyt huomioidut taudin yleisyydestä ja sen vaikutuksesta koirien työ- ja harrastuskäyttöön ovat kuitenkin huolestuttavia. Mikäli spondyloosia ei aleta jalostusvalinnoilla vastustamaan, tauti leviää näin pienessä populaatiossa, jossa jalostuskäyttö kasaantuu vain muutamille koirille, nopeasti.

Australiankarjakoirilla spondyloosia esiintyy jo hyvin nuorilla koirilla. Joillain koirilla muutokset ovat huomattavissa selkärangasta otettavista sivukuvista jo kaksivuotiaina. Spondyloosin perinnöllisyydestä australiankarjakoirilla on merkkejä – spondyloosia esiintyy usein esimerkiksi pentuesisaruksissa, ja spondyloosia sairastavien koirien jälkeläisiltä spondyloosia on voitu löytää jo hyvin nuorina. Spondyloosia on todettu sekä Suomessa kasvatetuissa että ulkomailta tuoduissa koirissa. Spondyloosi saattaa valitettavasti pysyä pitkään oireettomana rodun korkean kivunsietokyvyn takia tai oireet saattavat olla hyvin pieniä. Siksi sairasta mutta vähäoireista koiraa saatetaan käyttää jalostukseen terveenä ja tutkimattomien koirien käyttäminen lisää taudin leviämisen riskiä populaatiossa.

Pienessä populaatiossa kaikkien sairaiden koirien sulkeminen jalostuksesta ei ole mahdollista. Jalostukseen käytettäviltä koirilta spondyloosi on ensisijaisen tärkeä tutkia. Spondyloosisairas koira tulisi aina yhdistää terveeseen yksilöön ja nuoret koirat joilla on selkeitä muutoksia, tulisi

mahdollisuuksien mukaan jättää pois jalostuksesta. Nuorilla koirilla esiintyviä muutoksia pidetään herkemmin periytyvinä kuin vanhojen koirien lieviä muutoksia, näin on syytä olettaa myös australiankarjakoiran kohdalla.

Spondyloosi saattaa australiankarjakoirilla oireilla rajustikin ja siitä aiheutuva kipu voi muuttaa suuresti koiran käytöstä. Harrastus- ja työkäyttöä joutuu usein rajoittamaan. Lisäksi useita australiankarjakoiria on jouduttu lopettamaan spondyloosin aiheuttamien oireiden ja kipujen vuoksi. Kyseessä on merkittävästi rodun terveyttä vaarantava sairaus jonka leviämistä tulee pyrkiä estämään järkevillä jalostusvalinnoilla ja jalostukseen käytettävien koirien ja näiden lähisukulaisten tutkimisella.

Taulukko 33 SPONDYLOOSILAUSUNNOT, SYNTYMÄVUOSI 2005-2015

Vuosi	Syntyneitä	0	1	2	3	4	Yhteensä
2005	49	2	0	0	0	0	2
2006	36	0	0	0	0	0	0
2007	28	2	0	0	0	0	2
2008	34	0	2	0	0	1	3
2009	35	2	1	2	0	1	6
2010	36	5	1	0	0	0	6
2011	32	8	0	1	0	1	10
2012	36	4	4	1	1	0	10
2013	29	6	0	0	0	0	6
2014	13	0	1	0	0	0	1
2015	24	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	354	29	9	4	1	3	46

Huom. Lausuntoikä vaikuttaa siihen, että vuonna 2013-2015 syntyneiden koirien tutkimustuloksia on niin vähän.

Taulukko 34 MUUT RODULLA TODETUT MERKITTÄVÄT SAIRAUDET

SAIRAUUS	KUVAUS	GEENITESTI/ PERIYTYMINEN	HOITO	YLEISYYS
EPILEPSIA	Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö.	Ei Ei tiedossa	Lääkitys	Harvinainen, Suomessa tiedettyjä epilepsiakoiria alle 10 kappaletta
KUUROUS	Australiankarjakoirilla esiintyy synnynnäistä, perinnöllistä kuuroutta, joka todetaan pentujen ollessa n. 6 viikkoa vanhoja. Koira voi olla täysin kuuro tai toispuoleisesti kuuro.	Ei Ei tiedossa	Ei hoitoa	Esiintyy n. 12% rodun yksilöistä, toispuoleisen kuurous yleisempää kuin täyskuurous.
NCL	Perinnöllinen sairaus, jossa geenivirhe aiheuttaa kuona-aineiden kertymistä hermosoluihin kuten aivosoluihin. Kuona-aineiden vaikutuksesta solut rappeutuvat ja tuhoutuvat. Sairaus johtaa vakaviin neurologisiin oireisiin ja kuolemaan.	Ei Periytyy autosomaalin resessiivisesti	Ei hoitoa	Erittäin harvinainen. Suomessa 2 varmistettua NCL-tapausta. Maailmanlaajuisesti varmennettuja tapauksia 5 kpl.
PRIMÄÄRI LINSSILUKSAATIO	Perinnöllinen silmänsairaus, jossa linssi siirtyy normaalilta paikaltaan, aiheuttaen silmään voimakasta kipua ja silmän sisäisen paineen kasvua	KYLLÄ Periytyy autosomaalin resessiivisesti	Leikkaus	Sairaiden koirien esiintyminen harvinaista geenitestin vuoksi. Kantajia Suomessa testatuista koirista 15 %.

RISTISIDEVAURIO	Polven etummaisen ristositeen repeämä on tavallisin koiran tuki- ja liikuntaelimestön sairaus. Ristositeen repeämän voi aiheuttaa voimakas trauma. Ristisidevauriot ovat yleisimpiä roduilla ja yksilöillä, joilla puutteelliset polvikulmaukset.	Ei Syyt sairauteen osittain perinnöllisiä	Leikkaus	Melko harvinainen, mutta rodulla tunnettu ja yleisin leikkaushoitoa vaativa sairaus maailmanlaajuisesti
VÄLIMUOTOINEN LÄNNERISTINIKAMA	Synnyntäjäin ja perinnöllinen nikamaepämuodotuma länne-ristinikamassa. Voi aiheuttaa cauda-equina hermokimpun puristustilaa, kipua ja liikkumisvaikeuksia. Joillain koirilla oireeton.	Ei Ei tiedossa	Oireiden lievitys levolla ja lääkkeillä	Löydetty 12%:lla Suomessa tutkituista koirista

4.4.2.2. EPILEPSIA:

Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran yleisin neurologinen sairaus.

Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen toiminnan, autonomisen hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuissaan tai tajuton. Jos koko koira kouristelee, puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus voi esiintyä myös paikallisena, jolloin vain yksi lihasryhmä, esimerkiksi koiran raaja tai raajat kouristelevat. Paikallisalkuinen kohtaus voi laajeta yleistyneeksi kohtaukseksi. Kohtauksen luonne riippuu purkauksen lähtöpaikasta aivoissa ja sen leviämisestä. Epilepsiaa sairastavaa koira ei saa käyttää jalostukseen. Samoin on vältettävä sellaisten riskilinjojen yhdistämistä, joiden tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä, niin kauan kun rodulle ei ole olemassa geenitestiä, jonka avulla sairauden kantajuus voidaan todeta.

Ensimmäinen epilepsiakohtaus tulee useimmiten nuorena, 1-5 – vuotiaana, mutta perinnöllinen epilepsia voi alkaa missä iässä hyvänsä. Samantyyppisiä kohtauksia voivat aiheuttaa myös muut sairaudet kuin epilepsia. Epilepsiadiagnoosi pohjautuu muiden sairauksien poissulkemiseen. Siksi koirasta otetaan virtsa- ja verinäytteitä ja tehdään neurologinen tutkimus. Jollei muuta selittävää syytä löydy, koira sairastaa epilepsiaa. Epilepsiaa ei voida parantaa, vaan koira tarvitsee lääkitystä koko loppuelämänsä ajan. Lääkityksen aloituspäätökseen vaikuttaa kohtauksien esiintymistiheys ja vakavuus. Lääkityksen avulla epilepsiakohtausten esiintymistä voidaan harventaa, kohtauksia lieventää ja niiden kestoa lyhentää. Joskus kohtaukset saadaan lääkityksellä kokonaan loppumaan.

Australiankarjakoirilla epilepsia ei ole kovin yleinen sairaus. Epilepsiaa sairastavia australiankarjakoiria on Suomessa esiintynyt muutamia kappaleita. Myös maailmalla epilepsiaa tiedetään sairastavista australiankarjakoirista, mutta laajalle levinneestä ongelmasta ei rodun kohdalla ole tällä hetkellä kyse.

Nuorena epilepsian vuoksi lopetettujen koirien kohdalla ei voida poissulkea NCL:ää kohtausten aiheuttajana, joten epilepsian vuoksi lopetetut koirille on aina syytä suorittaa ruumiinavaus NCL:n varalta.

4.4.2.3. KUUROUS

Kuulo on yksi koiran tärkeimmistä aisteista. Kuuloaistimus syntyy aivoissa, johon kuuloelimessä syntynyt äänen aiheuttama endolymfanesteen värähtely johtuu sähköisessä muodossa.

Sekä varsinaisen kuuloelimen että kuuloaistimusta aivoihin välittävien hermojen kehitys ja ylläpito on varsin monisyinen prosessi ja erilaiset häiriöt joko itse kuuloelimessä tai välittävissä hermoradoissa tai aivojen kuuloalueella voivat johtaa alentuneeseen kuuloon tai täydelliseen kuuroutumiseen.

Koirilla synnynnäisestä kuuroudesta ei vielä ole olemassa tarkkaa tutkimustietoa. Kuurouden perimmäinen syy jää usein hämärän peittoon. Synnynnäistä kuuroutta tai etenevää kuulon rappeutumista voivat aiheuttaa myös ns. ototoksiset aineet, joita ovat mm. eräät antibiootit ja eräiden infektioiden tuottamat toksiinit. Myös äkillinen kova ääni tai jatkuva korkeatasoinen melu aiheuttaa kuuloaistinsolujen tuhoutumista ja etenevää kuulon alenemista.

Merkittävin kuurouden aiheuttaja useilla roduilla liittyy kuitenkin perimään. Kuurouden geneettinen tausta on usein epäselvä ja sekä autosomaalista resessiivistä, autosomaalista dominoivaa että X-

kromosomivälitteisesti periytyviä kuurouden muotoja on kuvattu eri roduilla. Jalostustieteellinen toimikunta on linjannut, että *kuuroja tai toispuoleisesti kuulevia koiria ei tule käyttää jalostukseen*. Myös toispuoleinen kuurous voi aiheuttaa koiralle hyvinvointiongelmia, jos koira ei esimerkiksi pysty paikantamaan kuulemaansa ääntä.

Koirilla esiintyy myös värigeenejä, jotka aiheuttavat ns. toissijaista eli sekundääristä synnynnäistä kuuroutta. Merkittävimpiä näistä geeneistä ovat valkoläiskäisyyttä ja valkoisuutta aiheuttavat piepaldismi (sp)- ja white spotting –geeni (sw) sekä marmorointiväriä aiheuttava merle –värigeeni. Näiden geenien vaikutus väreihin heijastaa niiden merkitystä melanosyyttien eli ihon pigmenttiä tuottavien solujen ylläpitoon.

Melanosyytit ovat peräisin ns. hermostopienasta ja ne vaeltavat sikiökehityksen aikana eri puolille elimistöä, myös kehittyvän korvan alueelle. Täysin valkoisilla koirilla (sw/sw) tai merle-geenin suhteen homotsygooteilla yksilöillä melanosyytit puuttuvat kokonaan tai niitä on vain murto-osa normaalista määrästä. Melanosyytit puuttuvat tällöin myös kehittyvän sisäkorvan alueelta.

Melanosyyttien merkitystä sisäkorvan kehityksessä ei vielä kokonaan ymmärretä, mutta melanosyyttien on havaittu ylläpitävän sisäkorvan käytävään endolymfanestettä tuottavaa stria vascularis- verkostoa. Jos ko. verisuonisto ei kehity normaalisti melanosyyttien puuttuessa, ei korvassa ole endolymfaa eikä synny kuuloaistimukselle välttämätöntä värähtelyä. Sisäkorvan rakenteet usein myös surkastuvat ja kuulo on pysyvästi vaurioitunut ja usein seurauksena on molemmissa tai kummassakin korvassa täydellinen ns. sekundäärinen kuurous. On myös mahdollista, että melanosyytteihin vaikuttavat molekyylit vaikuttavat myös muuhun hermostopienaan, jolloin kuurous voi johtua myös kuuloelimeen liittyvien hermostopienasta lähtöisin olevien ns. stato-akustisten hermopäätteiden puutteellisesta erilaistumisesta.

Australiankarjakoirien kuurous on synnynnäistä, väritykseen liittyvää kuuroutta. Australiankarjakoirien kuuroutta on tutkittu Australiassa. 899 koiraa kattanut tutkimus julkaistiin 2012 ja siinä todettiin australiankarjakoirien kuurouden johtuvan melanosyyttien puutteellisesta esiintymisestä.

Kuuroutta esiintyi 10,8%:lla tutkituista koirista, näistä koirista 7,5% olivat toispuoleisesti kuulevia ja 3,3% täysin kuuroja. Tutkimuksessa seurattiin rodun värimerkkien ja kuurouden yhteyttä. Sinisillä ja punaisilla koirilla kuuroutta esiintyy yhtä paljon, merkityksellisempää kuurouden ilmenemisen kannalta on koirien naamoissa esiintyvät merkit ja australiankarjakoiralla ei-toivotut kropan väriläiskät.

Koirilla, joilla värimerkit ovat molemmin puolin päätä, kuuroutta esiintyi 4,4%:lla.

Koirilla, joilla ei ollut päässä merkkejä, kuuroutta esiintyi 14,6%:lla.

Toispuoleisten värimerkkien ei huomattu vähentävän kuurouden riskiä.

Koirilla, joilla ei ollut kropassa värimerkkejä, kuuroutta esiintyi 12,8%:lla.

Koirilla, joilla oli selviä värillisiä merkkejä kropassa, kuuroutta esiintyi 4,8%:lla.

Tutkimuksessa selvitettiin myös vanhempien kuulostatuksen vaikutusta kuurouden esiintymiseen.


Käytettyjen urosten kuulostatukset olivat paremmin tiedossa kuin jalostukseen käytettyjen narttujen.

Täysin kuulevan uroksen pennuilla kuurouden esiintyvyys oli 8,7%.

Toispuoleisesti kuulevan uroksen pennuilla kuurouden esiintyvyys oli 37,5%.

SSuomessa pennut testataan 6-8 viikon iässä BAER-testillä, jolloin niiden kuulostatus on tiedossa jo tulevilla ostajilla. Vuosina 2000-2015 Suomen Kennelliitto rekisteröi 561 australiankarjakoiraa. Tästä koiramäärästä on yhdistykselle ilmoitettu 260 kpl kuulotestatuiksi, mikä on 46,3 % koko kyseisen ajan rekisteröinneistä. Vuosina 2000-2015 baer-testatuista 229 olivat täysin kuulevia, 28 olivat toispuoleisesti kuulevia ja 3 olivat täysin kuuroja.

Kaavio 4 KUULOTESTATUT KOIRAT SUOMESSA 2000-2015



Yhdistykselle ilmoitetuista koirista 12% esiintyy kuuroutta, täysin kuurojen määrä on vähäinen, 1,2%.

Täysin kuurojen koirien määrää ei vastaa syntyneiden täysin kuurojen koirien määrää, sillä suurin osa synnynnäisesti täysin kuuroista pennuista lopetetaan jo ennen kuulotestausta. Tutkimattomien osuus voi olla ilmoitettua pienempi, sillä kaikkia tutkimustuloksia ei anneta yhdistyksen tietoon.

4.4.2.4. NCL (neuronal seroidilipofuskinooosi)

Australiankarjakoirilla tavataan NCL-ryhmään kuuluvaa neuronaalista seroidilipofuskinooosia. NCL-ryhmään kuuluvat sairaudet ovat kuolemaan johtavia, yleensä resessiivisesti periytyviä sairauksia. Niissä mutaatiosta johtuva geenivirhe aiheuttaa sen, että hermosoluihin alkaa kertyä tiettyä kuona-ainetta. Solut rappeutuvat ja lopulta vaurioitunut solu tuhoutuu. Hermosoluissa vauriot ovat kohtalokkaita. Ihmisillä tunnetaan tällä hetkellä ainakin 8 erilaista NCL-ryhmään kuuluvaa sairautta. Koirilla on toistaiseksi varmistettu ainakin 4 eri geenin mutaatiosta johtuvaa erilaista NCL-ryhmään kuuluvaa sairautta.

NCL-ryhmään kuuluvia sairauksia on löydetty useilta koiraroduilta. Muutamalle rodulle on jo saatu kehitettyä geenitesti niillä yleisimmin esiintyvään NCL-muotoon. Geenitesti on tärkeä paitsi sairauden leviämisen estämisessä myös diagnoosissa.

NCL-sairauksille on tyypillistä: - muutokset koiran käyttäytymisessä (esim. aggressiivisuus, pelkotilat, yliaktiivisuus, apaattisuus, dementia, ruokahalumuutokset) - erilaiset neurologiset oireet (esim. tasapaino- ja liikeratahäiriöt, epileptiset kohtaukset, aistihäiriöt). Tietyille NCL-ryhmän sairauksille on tyypillistä silmäpohjasta löytyvä, PRA-muutoksia muistuttava kertymä. Joissain NCL-muodoissa koira vaikuttaa sokealta mutta peilauksessa silmissä ei havaita muutoksia.

Useimmissa NCL-ryhmän sairauksissa oireet tulevat esiin jo melko nuorella, alle 2-vuotiailla koirilla. Oireiden esiintuloikä voi olla kuitenkin huomattavasti myöhäisempikin. Esiintuloikään vaikuttaa paitsi sairauslaji myös yksilölliset ominaisuudet. Alussa oireet ovat lieviä ja voivat esiintyä jaksottain. Sairauden edetessä oireet voimistuvat, esimerkiksi kohtaukset tihentyvät ja sairaus alkaa haitata elämää niin voimakkaasti, että yleensä päädytään eutanasiaan. Samankaltaista oireilua voivat aiheuttaa myös useat muut sairaudet, esim. maksan toimintahäiriöt, kasvainsairaudet tai erilaiset kiputilat.

Tämän ryhmän sairaudet ovat varsin harvinaisia, eivätkä eläinlääkäritkään aina osaa NCL-sairautta oireilun perusteella epäillä. Sairaus voidaan tällä hetkellä varmuudella todeta koirilla vain ruumiinavauksessa tai geenitestillä jos sellainen on käytettävissä. Ruumiinavauksessa sairaiden koirien aivoista löytyy NCL-sairauksille tyypillisiä muutoksia.

Ensimmäiset tiedot tähän ryhmään kuuluvan sairauden löytymisestä australiankarjakoirilla tulivat

USA:sta 80-luvun alkupuolelta. Varmuudella todettuja tapauksia oli vain kolme, kahdessa eri pentueessa. Näissä tapauksissa koirat alkoivat oireilla n. 1-v. iässä. Ensimmäisinä oireina oli näköhäiriöitä, koordinaatiohäiriöitä ja muutoksia käyttäytymisessä, kuten ahdistusta ja pelkoreaktioita ääniä ja vieraita kohtaan. Sairaus paheni nopeasti ja koirat lopetettiin n. 18–26 kk iässä, jolloin ne olivat lähes sokeita, anorektisia ja niillä oli varsin pahoja liikkumisvaikeuksia, kohtauksia ja äärimmäisiä pelkotiloja. Emme tiedä näiden koirien nimiä emmekä sukulinjoja. Kaksi koirista oli pentuesisaruksia mutta ei ole tiedossa oliko kolmas koira näille jotain sukua. Sairaiden koirien vanhempien mahdollisia sukulaisuussuhteita ei tunneta.

Seuraavat varmistetut tapaukset löytyivät Suomesta v. 2005 lopulla ja v. 2006 alussa. Ensimmäinen löydös Suomessa tehtiin n. 1,5 vuoden iässä pääasiassa vakavien käytöshäiriöiden vuoksi lopetetusta australiankarjakoirauroksesta. Koiralla todettiin alkuvaiheessa oleva NCL.

Hieman tämän jälkeen sairaus löydettiin n. 2,5 v ikäisestä uroksesta, jonka oireet viittasivat pahaan allergiaan. Tälläkin todettiin melko varhaisessa vaiheessa oleva NCL.

Suomalaistapauksissa koirat olivat läheistä sukua toisilleen. Koirien isät olivat veljeksiä ja myös emälinjoista löytyy läheisiä yhteyksiä isälinjassa esiintyviin koiriin. Nämä suomalaiset tapaukset poikkeavat jonkin verran aiemmista. Tietoa on kuitenkin niin niukasti että emme voi varmuudella päätellä onko kyse samasta mutaatiosta vai ei. Myöskään periytymismekanismia ei ole voitu täysin varmistaa. Tällä hetkellä oletamme tämän sairauden olevan yksinkertaisella resessiivisellä tavalla periytyvä, kuten tämän ryhmän sairauksien on yleensä osoitettu olevan.

Näiden jälkeen on Suomessa jonkin verran tutkittu australiankarjakoiria, joilla oireilun tai sukutaustan perusteella on epäilty NCL-sairautta. Uusia tapauksia ei kuitenkaan ole tullut vuoden 2015 joulukuuhun mennessä tietoon.

Tilanne joulukuussa 2015:

Suomalaiset pentueet, joista sairautta löytynyt

1. Cossaks T-pentue, s. 2.5.2004

Vanhemmat: Cattlefarm's Darra Power ja Cossaks Runaway Ringa

Sairaaksi todettu koira: Cossaks Total Recall

2. Cattlefarm's pentue s. 16.8.2003

Vanhemmat: Cattlefarm's Magnum Max ja Cattlefarm's Wild Wind

Sairaaksi todettu koira: Cattlefarm's Blu Notbadatall

Edellä mainitut koirat nykytiedon mukaan periyttävät sairautta. Neuronaalista seroidilipufuskinoosia periyttävää koiraa ei saa käyttää jalostukseen eikä NCL:ää periyttävien koirien lähisukulaisiin tule linjata.

Koirageenit-työryhmä Suomessa on kerännyt verinäytteitä suomalaisista australiankarjakoirista geenitestiä varten. Vuodesta 2015 Genoscoper on tarjonnut mahdollisuutta NCL8 geenin testaamiseen australiankarjakoirilta. Testiä ei ole kehitetty suomalaisista australiankarjakoirista otetuista verinäytteistä vaan geeni on löydetty sekarotuisista koirista, joiden taustalla on australiankarjakoiraa ja australianpaimenkoiraa.

Suomalaisilla australiankarjakoirilla esiintyneen NCL-muodon ei ole varmennettu olevan NCL8 geenin aiheuttama.

4.4.2.5. PRIMÄÄRI LINSSILUKSAATIO

Linssiluksaatio (primääri) on perinnöllinen silmäsairaus joillakin roduilla (pääasiassa pienet terrierirodot). Se tarkoittaa linssin siirtymistä normaalilta paikaltaan joko etukammioon sarveiskalvon taakse tai takakammioon lasiaiseen. Linssiluksaatio aiheuttaa silmään voimakasta kipua, värikalvon tulehdusta ja usein myös silmän sisäisen paineen nousua (glaukooma). Linssiluksaation hoito on leikkaushoito. Linssiluksaation periytyy australiankarjakoiralla autosomaalisesti resessiivisesti ja siihen on olemassa geenitesti. Kahta kantajaa ei tule yhdistää keskenään, eikä sairasta koiraa saa yhdistää kuin terveeseen koiraan.

Suomalaisista australiankarjakoirista 66 kappaleesta on tehty PLL-geenitesti, tai niiden PLL-status on vanhempien tulosten perusteella tiedossa.

TERVEITÄ: 55 kappaletta

KANTAJIA: 10 kappaletta

SAIRAITA: 1 kappale

Sairaus ei ole rodulla yleinen, mutta kuten kaikkien autosomaalisti resessiivisten sairauksien kanssa, on jalostuskoiria syytä tutkia ja huolehtia siitä, että kantajien määrä populaatiossa ei kasva liian suureksi.

4.4.2.6. POLVEN ETURISTISTEEN VAURIOT

Polven etummaisen ristisiteen repeämä on tavallisin koiran tuki- ja liikuntaelimestön sairaus. Ristisiteen repeämää esiintyy monilla roduilla, mutta tavallista se on mm. rottweilereilla, chow-chow:lla, noutajilla, bichon friseella ja mastiffeilla. Koiralla eturistisiteen repeämä voi olla myös trauman aiheuttama äkillinen tila. Koiralla polven ristiside tavallisimmin pettää osittain ja vähitellen viikkojen – kuukausien aikana ja lopulta katkeaa aivan normaalin liikunnan seurauksena. Ristisiteen pettämisen oire on ontuma. Kun ristiside on osittain poikki, ontuma on vaihtelevaa ja se voi tilapäisesti loppua kun raajaa rasitetaan vähemmän. Kun ristiside on kokonaan poikki, ontuma on yleensä jatkuvaa. Koiralla, jolla toisen polven ristiside on pettänyt on melko suuri todennäköisyys (n. 30%) saada sama vaiva toiseenkin polveen. Joidenkin tutkimusten mukaan tämä riski on tietyillä roduilla jopa 70%.

Ristisiteen pettämisen eräs syy on nykykäsityksen mukaan ”huonot takaraajan kulmaukset” eli reisiluun ja sääriluun välinen kulma lähestyy oikokulmaa, 180 astetta. Tällöin sääriluun yläpään nivelpinta ei enää ole vaakatasossa vaan taaksepäin vinossa. Tämän seurauksena aiheutuu sääriluuta eteenpäin työntävä voima joka kerta kun reisiluun nivelpinta tukeutuu sääriluun yläpään nivelpintaan. Tämä toistuva voima lopulta katkaisee etummaisen ristisiteen. Kulmauksiltaan ”normaalilla alkukantaisella koiralla” tällaista voimaa ei juuri synny. Myös koiran ylipaino ja reiden huono lihastasapaino altistaa ristisiteen repeämälle.

Koiran ylipainon ennaltaehkäisy on tärkeä keino estää ristisidevaurioita. Jalostuksessa tulee ottaa huomioon terveiden, hyvien kulmausten merkitys ongelmien vähentämisessä.

4.4.2.7. VÄLIMUOTOINEN LANNE-RISTINIKAMA

Välimuotoinen lanne-ristinikama (lumbosacral transitional vertebra, LTV) on yleinen synnynnäinen ja perinnöllinen nikamaepämuodostuma, jonka periytymismekanismeja ei tunneta. LTV:llä tarkoitetaan nikamaa, jossa on sekä lanne- että ristinikaman piirteitä. Välimuotoinen nikama voi olla viimeinen lannenikama (L7), jolloin puhutaan sakralisaatiosta tai ensimmäinen ristiluun nikama (S1), jolloin puhutaan lumbalisaatiosta. Muutos voi olla symmetrinen eli samanlainen oikealla ja vasemmalla puolella tai epäsymmetrinen, jolloin selällään otetussa röntgenkuvassa nähdään puoliero. Diagnoosi tehdään usein lonkkakuvasta, josta voidaan nähdä koiran ristiluu ja lanne-ristiluuliitos yhdestä suunnasta (”ylhäältäpäin”). Joillain koirilla lannenikamien lukumäärä on poikkeava, normaalin 7 nikaman sijaan näillä koirilla on 8 tai 6 lannenikamaa. Tämä on yksi LTV:n muoto ja se voidaan nähdä

sivusuunnasta otetusta röntgenkuvasta (koira on kuvattaessa kyljellään), jossa ristiluun lisäksi näkyy koko lanneranka.

LTV:tä esiintyy useilla koiraroduilla, ja ainakin saksanpaimenkoirilla sen yhteydestä selkävaivoihin on tutkimustietoa. LTV altistaa lanne-ristiluuliitosalueen varhaiselle rappeutumiselle, minkä seurauksia voivat olla takaselän kivut ja pahimmassa tapauksessa takajalkojen halvausoireet. Hoitona käytetään lepoa ja kipulääkkeitä ja vakavimmissa tapauksissa leikkaushoitoa. Kotikoirina sairastuneet koirat pärjäävät usein melko hyvin, mutta ennuste paluusta harrastus- tai työkoiraksi on epävarma.

Välimuotoisia lanne-ristinikamia on tutkittu australiankarjakoirilla Suomessa 34 kappaletta:

LTV1 (jakautunut ristiluun keskiharjanne (s1-s2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne): 2 kpl

LTV2 (Symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama): 1 kpl

LTV3 (Epäsymmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama): 1 kpl

LTV4 (6 tai 8 lannenikamaa): 0 kpl

4.4.3 Yleisimmät kuolinsyyt

Kuolleita australiankarjakoiria on omakoira kautta ilmoitettu yhteensä 138 koira, joista 22 koiran kohdalla kuolinsyytä ei ole ilmoitettu. Määrä on melko pieni, mutta tuloksien voidaan ajatella olevan suuntaa-antavia yleisimpien kuolinsyiden kohdalla.

Australiankarjakoiran keskimääräinen elinikä on 8 vuotta ja 6 kuukautta, eliniänodotetta laskevat etenkin nuorena erilaisissa tapaturmissa ja liikennevahingoissa kuolleet koirat. Toinen merkittävä nuorien koirien kuolinsyy on lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi. Vastapainona rodun yleisin yksittäinen kuolinsyy on vanhuus. Vanhuuteen lopettujen koirien keskimääräinen elinikä on lähes 14 vuotta. Terveet vanhukset eivät ole rodussa harvinaisia.

Taulukko 35 YLEISIMMÄT KUOLINSYYT 1988-2015 (4.11.2015)

Kuolinsyy	Keskim. elinikä	Yhteensä
Hengitystiesairaus	8 vuotta 0 kuukautta	3
Hermostollinen sairaus	7 vuotta 2 kuukautta	3
Immunologinen sairaus	6 vuotta 7 kuukautta	1
Kasvainsairaudet, syöpä	9 vuotta 5 kuukautta	13
Kuollut ilman sairauden diagnosointia	10 vuotta 3 kuukautta	3
Lopetus ilman sairauden diagnosointia	11 vuotta 5 kuukautta	6
Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi	4 vuotta 8 kuukautta	13
Luusto- ja nivelsairaus	7 vuotta 6 kuukautta	13
Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus	7 vuotta 1 kuukautta	3
Muu sairaus, jota ei ole listalla	5 vuotta 6 kuukautta	5
Petovahinko	0 vuotta 2 kuukautta	2
Selkäsairaus	8 vuotta 6 kuukautta	3
Sydänsairaus	2 vuotta 10 kuukautta	2
Tapaturma tai liikennevahinko	6 vuotta 0 kuukautta	13
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)	13 vuotta 8 kuukautta	32
Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus	10 vuotta 7 kuukautta	1
Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu	6 vuotta 2 kuukautta	22
Kaikki yhteensä	8 vuotta 6 kuukautta	138

Jalostusvalinnoilla voidaan vaikuttaa australiankarjakoirien kuolemansyihin. Merkittävin on pitkäikäisyyden ja terveyden vaaliminen. Jalostuksessa tulee suosia koiria pitkäikäisistä suvuista ja pyrkiä siihen, että koirat pysyvät elinvoimaisena pitkään. Karjakoiran kuuluu olla kestävä ja pitkäikäinen.

Koirien tapaturmisiin kuolemiin on jalostusvalinnoilla vaikea vaikuttaa – rodun reaktiivisuus,

paimennusvaisto ja esimerkiksi työkäytössä olevien koirien elinympäristö suurten eläinten, autojen ja koneiden keskellä lisää tapaturmariskiä.

Kuolinsyynatilaston perusteella kahteen asiaan tulisi jalostuksessa kiinnittää entistä enemmän huomiota – vakaviin luonne- ja käyttäytymisongelmiin ja luusto- nivel- ja selkäsairauksiin. Tasapainoisen, rodunomaisen luonteen vaaliminen on ensisijaisen tärkeää. Vakavat luonneongelmat vaarantavat koiran elämänlaadun ja koska australiankarjakoira on voimakas ja reaktioissaan nopea koira, voi se pahimmillaan olla ympäristölleen vaarallinen. Luonnetestaamattomien koirien käyttö jalostuksessa lisää yllättävien luonneominaisuuksien periytymisen riskiä. Kahta koiraa, joilla on samantyyppisiä ei-toivottavia piirteitä kuten huomattavaa pidättyväsyyttä tai terävyyttä ei tule jalostuksessa yhdistää luonneongelmien ennaltaehkäisyssä. Jalostuksessa tulee ottaa myös huomioon jalostukseen käytettävien koirien lähisukulaississa esiintyviä luonteenpiirteitä. Jalostuksessa tulee suosia tasapainoisia, luonnetestattuja ja arjessa ongelmattomia koiria, vaalien samalla kuitenkin rodunomaista temperamenttia ja aktiivisuutta.

Vakavien luusto-, nivel- ja selkäsairauksien esiintymiseen pystytään vaikuttamaan jalostusvalinnoilla. Ensisijaisen tärkeää on jalostukseen käytettävien koirien tutkiminen. Myös suvussa kulkevien riskien huomioonottaminen on tärkeä osa luusto- nivel- ja selkäsairauksien ennaltaehkäisyä.

Luusto- ja nivelsairaudet aiheuttavat koirille kipua. Nykykäsityksen mukaan koira tuntee kipua ihmisen tavoin. Akuutti kipu aiheuttaa sympaattisen hermoston aktivoitumisen, mikä voidaan nähdä hyvin erilaisina fysiologisina muutoksina kuten esimerkiksi sydämen sykkeen kiihtymisenä, hengityksen tihenemisenä, erilaisina kehon jännittyneisyyksinä ja kuumotuksina. Näiden kipureaktioiden huomaaminen voi olla maallikolle vaikeaa. Kroonisella kivulla tarkoitetaan kipua joka voi kestää kuukausia tai vuosia. Krooninen kipu voi muuttua hermovauriokivuksi, joka vastaa huonosti tavalliseen kipulääkitykseen.

Luusto- ja nivelsairauksista aiheutuva kipu on hoitamattomana jatkuvaa, mutta sen määrä vaihtelee. Koiralla voi olla hyviä ja huonoja kausia. Australiankarjakoirien sairauksista esimerkiksi nivelrikon tai yleisen spondyloosin aiheuttama kipu ovat kroonisia. Hoitamattomana kipu johtaa muutoksiin koiran liikkumishalussa, hyppäämisen ja juoksemisen vähentyminen, ravien muuttuminen peitsämiseksi tai portaiden välttäminen voivat olla merkkejä kroonisesta kivusta.

Kipu vaikuttaa myös koiran käyttäytymiseen. Australiankarjakoira on yksi rodusta joiden alkuperäinen käyttötarkoitus on vaatinut korkeaa kipukynnystä ja työskentelyn jatkamista kivun alla. Siksi rotu

näyttää kipua huonommin kuin moni muu rotu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö koira tuntisi kipua. Australiankarjakoirille tyypillisiä tapoja näyttää kipua ovatkin käyttäytymisen muutokset – kivuliaan koiran terävyys lisääntyy, se voi muuttua pidättyväisemmäksi, vartiointitaipumus kasvaa, tai se voi alkaa kehittää muita käytösongelmia. Koiran käyttäytymisen muuttuessa on hyvä aina selvittää, johtuuko käyttäytyminen kivusta.

On todennäköistä että osa luonne- ja käytösongelmien vuoksi lopetetuista australiankarjakoirista ovat tosiasiallisesti olleet kivuliaita. Koiran kokemasta kivusta ja sen vaikutuksesta tiedetään jatkuvasti enemmän. Myös ymmärtämys eri sairauksien aiheuttamasta kivusta laajenee. Pitkään esimerkiksi spondyloosia pidettiin täysin kivuttomana sivulöydöksenä, nykyään tiedetään spondyloosin aiheuttavan kipua ja jopa hermojuurivaurioita. Jalostuksen kannalta olisi tärkeää että syy koiran muuttuneeseen käytökseen tai käytösongelmiin saataisi selvitettyä, jotta ongelman oikea syy pystyttäisiin jalostuksessa ottamaan huomioon.

4.4.4 Lisääntyminen

Australiankarjakoira on keskikokoinen, normaalirakenteinen koira, jolla ei ole rakenteellisia piirteitä, jotka vaikuttaisivat koirien lisääntymiseen. Pienessä populaatiossa lisääntymiseen liittyvät ongelmat on otettava vakavasti. Australiankarjakoirilla yleisin lisääntymiseen liittyvä ongelma on pentujen syntyminen keisarinleikkauksella polttoheikkouden vuoksi.

Suomen australiankarjakoirat ry:n jalostustoimikunta keräsi kasvattajilta tietoa 2009-2014 syntyneistä pentueista: pentuemääristä, astutustilanteista, synnytyksistä, pentujen elinvoimaisuudesta ja emän ominaisuuksista. Suomalaiset australiankarjakoirakasvattajat osallistuivat kyselyyn erittäin aktiivisesti ja vuosina 2009-2014 syntyneistä 40 pentueesta kysely kattoi 37 pentuetta. Kasvattajilla oli mahdollisuus vastata kyselyyn nimettömänä, minkä toivottiin lisäävän avoimuutta ja rehellisyyttä ongelmista. Kyselyssä australiankarjakoirien suurimmat haasteet lisääntymisessä tulivat esiin – täysin luotettavina kyselyn tuloksia ei voida kuitenkaan pitää.

Keskimääräinen pentuekoko

Taulukko 36 AUSTRALIANKARJAKOIRIEN KESKIMÄÄRÄINEN PENTUEKOKO SUOMESSA 2005-2015

2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
5,2	4,7	4,4	3,9	3,7	3,4	4,4	4,1	4,0	4,4	4,8

Australiankarjakoirien keskimääräinen pentuekoko vaihtelee 3,4-5,2 välillä.

Astumisvaikeudet

Lisääntymiskyselyn perusteella astumisvaikeudet eivät ole rodulla yleisiä. Viiden vuoden aikavälillä vain kolme pentuetta on jäänyt toteutumatta koska astutus tai siemennys ei ole onnistunut.

Luonnollisten astumisten määrä rodussa vuosina 2009-2014 on ollut korkea – 95 prosenttia pentueesta saa alkunsa luonnollisesta astumisesta. Siemennystä on viime vuosina käytetty muutaman kerran ulkomaista urosta käytettäessä.

Astumisvaikeudet tulee rodussa ottaa vakavasti – ne voivat kertoa puuttellisesta sukupuolivietistä tai fyysisestä vaivasta joka estää luonnollisen lisääntymisen.

Tiinehtymisvaikeudet

Tiinehtymisvaikeudet eivät ole rodussa lisääntymiskyselyn valossa merkittävä huolenaihe – viiden vuoden aikana raportoitiin kolmesta pentueesta jossa astutus on onnistunut, mutta narttu ei ole tiinehtynyt. Lisäksi on raportoitu yhdestä pentueesta, jossa nartun tiineys on todettu, mutta pennut ovat menneet kesken. Kasvattajien on kuitenkin hyvä seurata käyttämiensä koirien tiinehtyvyyttä, ja käyttää harkiten koiria joilla itsellään tai joiden taustalla on merkittäviä tiinehtymisongelmia.

Synnytysongelmat

Synnytysvaikeuksia esiintyy jokaisella rodulla, mutta niiden määrä vaihtelee n. 5% aina lähes 100% asti. Synnytysvaikeukset ovat yleisempiä pentuemäärältä poikkeavien pentueiden kohdalla, hyvin pienet ja

hyvin suuret pentueet voivat siis lisätä synnytysvaikeuksien määrää. Lisäksi ensikertalaisilla on yleensä enemmän synnytysvaikeuksia kuin seuraavien pentueitaan synnyttävillä. Lisääntymiskartoituksessa ei kysytty synnytysongelmien suhteen sitä, oliko narttu ensikertalainen vai ei.

Yleisesti suurin osa synnytysongelmista on lähtöisin nartusta. Yleisimpänä syynä synnytysvaikeuksiin pidetään polttoheikkoutta, eli kohdun supistusten heikkenemistä, niiden puuttumista tai niiden loppumista kesken synnytyksen. Supistuksia voidaan koettaa vahvistaa oksitosiinipistoksella, mutta mikäli oksitosiinista ei ole apua, joudutaan usein turvautumaan keisarinleikkaukseen. Myös nartun synnytyselimissä voi esiintyä rakenteellisia vikoja, jotka estävät luonnollisen synnytyksen. Nämä ovat harvinaisempia syitä keisarinleikkaukseen.

Australiankarjakoirien luonnollisten synnytysten määrä, joissa narttu ei ole tarvinnut eläinlääkinnällistä apua, on 62% syntyneistä pennuista. Tämä tarkoittaa sitä, että jonkinasteisia synnytysvaikeuksia tavataan 38%:lla syntyneistä pentueista. 32% vuosina 2009-2014 syntyneistä pentueista on syntynyt keisarinleikkauksella. Australiankarjakoira on normaalirakenteinen ja keskikokoinen rotu, jolla ei ole liioiteltuja piirteitä kuten esimerkiksi isopäisillä bull-tyyppisillä roduilla, ja siksi keisarinleikkausten määrää voidaan pitää huolestuttavan suurena.


Nartusta johtuvat syyt keisarinleikkaukselle muodostavat australiankarjakoirilla 50% keisarinleikatuista pentueista ja polttoheikkous on suurin yksittäinen syy keisarinleikkaukselle. 42% keisarinleikkauksista voidaan ajatella johtuvan pennuista riippuvista syistä. Pennun suuri koko muodostaa neljäsosan (25%) keisarinleikkaukseen johtaneista syistä ja väärässä asennossa syntynyt pentu on syynä 17 prosenttiin keisarinleikkauksista. 8% kohdalla syy keisarinleikkaukseen ei ole selvillä tai sitä ei ole kerrottu. Pennun suuri koko voi olla seurausta pienestä pentueesta, jolloin yksittäiset pennut pääsevät kasvamaan turhan suuriksi.

Taipumusta polttoheikkouteen pidetään periytyvänä ominaisuutena, joten on odotettavissa, että myös jatkossa sitä tulee australiankarjakoirilla esiintymään. Etenkin polttoheikkouden takia keisarinleikkaukseen joutuneiden narttujen kohdalla jalostuskäyttöä tulee harkita vakavasti, mikäli polttoheikkoudesta johtuvien keisarinleikkauksien määrää halutaan rodussa vähentää. Vaikka suurin osa keisarinleikkauksista sujuu ongelmitta ja nartut toipuvat niistä hyvin, on leikkaus aina riski sekä nartulle että pennuille ja nartun palautuminen synnytyksestä on keisarinleikkauksen jälkeen hitaampaa. Keisarinleikatut nartut tarvitsevat myös muita useammin apua pentujen hoidossa ja saattavat pahimmassa tapauksessa hylkiä pentujaan tai jopa yrittää vahingoittaa niitä.


Taulukko 37 SYNNYTYKSET VUOSINA 2009-2014

	SYNNYTYKSET VUOSINA 2009-2014	Määrä:
1.	Narttu synnyttänyt luonnollisesti ilman erityisiä aputoimenpiteitä:	23
2.	Narttu on tarvinnut synnytysvaikeuksien takia eläinlääkinnällistä apua tai eläinlääkärikäynnin (ei keisarinleikkausta) :	2
3.	Nartulle on jouduttu tekemään keisarinleikkaus:	12
4.	Keisarinleikkauksen syyt: a) Polttoheikkous, eli kohdun supistusten puuttuminen: b) Väärässä asennossa syntyvä pentu: c) Pennun suuri koko: d) Nartun synnytyselinten rakenteellinen vika: e) Muu syy:	Määrä: 5 2 3 1 1
5.	Narttu on kuollut synnytykseen tai sen jälkeisiin komplikaatioihin:	0

Kaavio 5 SYNNYTYKSET 2009-2014



Kaavio 6 KEISARINLEIKKAUSTEN SYYT 2009-2014



Pentujen hoitamiseen liittyvät ongelmat nartuilla


Lisääntymistutkimuksessa suomalaisilla australiankarjakoirilla ei ilmoitettu pentujen hoitoon liittyviä ongelmia, keisarinleikatut nartutkin hoitavat pentunsa esimerkiksi. Hyviä emän ominaisuuksia tulee rodussa vaalia.

Pentukuolleisuus

Pentukuolleisuuden syitä on monia, aina tarttuvista taudeista erilaisiin kehityshäiriöihin ja epämuodostumiin. Pitkittynyt synnytys ja muut synnytysvaikeudet lisäävät pentukuolleisuuden riskiä.

Australiankarjakoirilla pentukuolleisuus on 13 %, joten pentukuolleisuuden määrä ei vaikuta huolestuttavalta. Synnytyksestä selvinneet pennut ovat elinvoimaisia ja ns. ”fading puppy” pentujen, jotka syntyvät heikkona ja kuolevat ensimmäisten vuorokausien aikana, määrä on vähäinen. Aikavälillä syntyneitä pentuja ei ole myöskään tarvinnut lopettaa vakavien epämuodostumien tai kehityshäiriöiden takia. Voidaan olettaa että lähes kaikilla elävänä syntyneillä pennuilla on hyvä mahdollisuus varttua aikuisuuteen.

Kaavio 7 PENTUJEN ELINVOIMAISUUS



Huom. Vuosina 2009-2014 rekisteröityjen pentujen määrä on 159.

Niiden kasvattajien, jotka kyselyyn vastasivat, syntyneiden pentujen määrä on yhteensä 149.

Luvut on laskettu kyselyyn vastanneiden kasvattajien pentueiden mukaan

4.4.5 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä

Keskeisimmät ongelmakohdat

Australiankarjakoirien terveyden ja lisääntymisen keskeisimmät haasteet:

- Spondyloosin runsas esiintyminen
- Lonkka- ja kyynärniveldysplasian vastustaminen
- Kokonaisvaltaisen terveyden jalostaminen
- Runsas keisarinleikkausten määrä

Ongelmien mahdollisia syitä

Australiankarjakoiran kaltaisessa populaatiossa, jonka jalostuskäyttö on jakautunut pienelle osalle yksilöitä, yksittäisellä jalostuskoiralla ilmenevä vika saattaa levitä populaatioon laajalle. Rodun alkuvuosina tehdyt yksipuoliset jalostusvalinnat ja runsaat linjaukset sekä sukusiitoskertoimien nousu on kenties mahdollistanut piilevien vikojen yleistymisen rodussa.

Koirien terveyden tutkiminen on mennyt eteenpäin ja monipuolistunut ja ymmärtämys koirien kokonaisvaltaisesta terveydestä on kasvanut. Tämä on haaste kasvattajille, mitä enemmän koirien terveydestä tiedetään, sitä enemmän vastaan tulee ei-täydellisiä yksilöitä. Pienessä rodussa kaikkia viallisia koiria ei voida sulkea pois jalostuksesta, ja huomiota pitää kiinnittää koiran kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ensimmäisenä jalostuksesta tulee karsia koirat, jotka oireilevat tai joiden viat haittaavat niiden arkielämää tai harrastamista.

Monisyisesti periytyvien luustosairauksien vastustaminen on haaste, kun esimerkiksi C-lonkkaisten, oireilemattomien koirien sulkeminen jalostuksen ulkopuolelle tarkoittaisi rajua karsintaa jo valmiiksi vähäisissä jalostusyksilöiden määrässä.

Runsas keisarinleikkauksien määrä on haastava ongelma kasvattajille. Vaikeat synnytykset voivat jättää myös epäselväksi sen, mistä synnytysvaikeuksissa todellisuudessa oli kysymys – liian suuresta pennusta, väärässä asennossa syntyvästä pennusta vai polttoheikkoudesta. Riittävien pentuekokojen ylläpito olisi myös tärkeää, mitä vähemmän pentuja narttu kantaa, sitä suuremmaksi yksittäiset pennut saattavat kasvaa.

4.5. Ulkomuoto

4.5.1. Rotumääritelmä

KÄYTTÖTARKOITUS: Karjakoira

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsinpaimenkoirat).

LYHYT HISTORIAOSUUS: Rotu kehitettiin työskentelemään Australian olosuhteissa karjatalouden varhaisvaiheessa. Tärkeimmät ominaisuudet olivat voimakkuus, puruvoima ja äärimmäinen sisukkuus, jotta koira kykenisi ohjailemaan ja pitämään hallinnassaan kesytöntä karjaa. Ensimmäiset maahan tuodut paimenkoirat eivät kyenneet tähän tehtävään. Australian varhaisimmilla maahanmuuttajilla ei ollut käytettävissään riittävästi työvoimaa, mikä aiheutti ongelmia karja- ja lammaslaumojen hallinnassa. Useimmat maatilat olivat aitaamattomia eikä pensasmaastoa ollut vielä raivattu. Niinpä tilalliset ryhtyivät kehittämään koirarotuja, jotka pystyisivät tehokkaasti työskentelemään karjan ja lampaiden kanssa. Rodun alkuperän selvittämiseksi on tehty runsaasti tutkimustyötä, mutta

varhaisimmat kasvattajat eivät juurikaan pitäneet kirjaa tekemisistään ja niinpä nykyisen australiankarjakoiran luomiseen käytetyistä roduista on olemassa hyvinkin eriäviä mielipiteitä. Yleisesti kuitenkin katsotaan, että rotu on syntynyt risteyttämällä blue merle -värisiä sileäkarvaisia collieita ja dingoja, ja tähän kantaan on myöhemmin lisätty dalmatiankoiraa ja kelpietä. Myös muita risteytyksiä kokeiltiin (mm. bullterrieriä), mutta nämä muut yhdistelmät eivät osoittautuneet soveltuviksi karjan kanssa työskentelyyn.

YLEISVAIKUTELMA : Vahva, tiivis, sopusuhtainen työkoira, jolla on kyky ja into suorittaa sille annettu vaativakin tehtävä. Sen massa, voima, tasapaino ja vahva lihaskunto antavat vaikutelman suuresta ketteryudesta, voimasta ja kestävydestä.

Pienikin taipumus liialliseen raskauteen tai honteluuteen on vakava virhe.

TÄRKEITÄ MITTASUhteITA: Rungon pituus mitattuna rintalastan kärjestä istuinluun kärkeen on suurempi kuin säkäkorkeus, suhteessa 10:9.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Rodun uskollisuus ja vartiointivaisto tekevät siitä erinomaisen karjalaumojen sekä isäntänsä omaisuuden itsenäisen vartijan. Luonnostaan epäluuloinen vieraita kohtaan, mutta sen täytyy kuitenkin mukautua käsittelyyn, etenkin näyttelykehässä. Kaikki työkoiralle vieraat luonne- tai rakennepiirteet ovat vakavia virheitä.

Australiankarjakoira on verraton karjan vartioija ja kuljettaja niin avoimilla kuin rajatuillakin alueilla. Aina valpas, äärimmäisen älykäs, tarkkaavainen, rohkea, luotettava ja sitkeä, mikä tekee siitä erinomaisen työ-koiran.

PÄÄ: Voimakas ja suhteessa runkoon.

Kallo: Leveä, korvien välissä hieman kaartuva.

Otsapenger: Vähäinen mutta selvästi erottuva.

Kirsu: Musta.

Kuono: Keskipituinen, syvä, voimakas, leveä ja silmien alta täyteläinen, kapenee vähitellen kirsua kohti. Päälaen ja kuononselän linjat yhdensuuntaiset.

Huulet: Tiiviit ja kuivat.

Leuat / hampaat: Voimakas, syvä ja hyvin kehittynyt alaleuka. Hampaat terveet, voimakkaat ja säännöllisessä rivissä. Leikkaava purenta, alaetuhampaat hieman yläetuhampaiden takana niitä kevyesti koskettaen. Koiran käyttötarkoituksen vuoksi terveet ja vahvat hampaat ovat erittäin tärkeitä.

Posket: Lihaksikkaat, eivät karkeat eivätkä ulkonevat.

Silmät: Tummanruskeat, soikeat, keskikokoiset, eivät ulkonevat eivätkä syvällä sijaitsevat. Ilmentävät valppautta ja älykkyyttä. Varoittava tai epäluuloinen katse vieraan lähestyessä on rodulle luonteenomainen.

Korvat: Keskikokoiset, mieluummin pienet kuin suuret, tyvestä leveät; lihaksikkaat, pystyt ja melko teräväkärkiset; eivät lusikkamaiset eivätkä lepakonkorvat. Etäällä toisistaan ja ulospäin suuntautuneet, herkästi liikkuvat; koiran ollessa valppaana pystyasentoiset. Korvalehdet ovat paksut ja sisäpuolelta hyvin karvaiset.

KAULA: Erittäin vahva ja lihaksikas; keskipituinen, runkoa kohti levenevä. Ei löysää kaulanalusnahkaa.

RUNKO:

Ylälinja: Vaakasuora.

Selkä: Vahva.

Lanneosa: Lyhyt, leveä, vahva ja lihaksikas. Kupeet syvät.

Lantio: Melko pitkä ja viisto.

Rintakehä: Syvä, lihaksikas ja kohtuullisen leveä. Hyvin kaareutuvat kylkiluut, pitkä mutta ei tynnyrimäinen rintakehä.

HÄNTÄ: Melko matalalle kiinnittynyt jatkaen viiston lantion linjaa ja ulottuen suunnilleen kintereeseen. Koiran ollessa rauhallinen riippuu alaspäin hännänpää loivasti kaartuen. Liikkeessä tai koiran ollessa jännittynyt häntä voi kohota, mutta häntä ei saa ylittää hännän tyven kautta piirrettyä pystysuoraa linjaa. Tuuheakarvainen.

RAAJAT

ETURAAJAT:

Yleisvaikutelma: Eturaajojen luut vahvat ja pyöreät. Eturaajat edestä katsoen suorat ja yhdensuuntaiset.

Lavat: Voimakkaat, viistot, lihaksikkaat ja olkavarteen nähden hyvin kulmautuneet. Lapaluiden kärjet eivät liian lähekkäin. Lavat eivät kuitenkaan ole niin lihaksikkaat, että raskas etuosa vaikeuttaisi koiran liikkumista ja rajoittaisi työskentelyä.

Välikämmenet: Joustavat, sivusta katsoen hieman viistot.

Etukäpälät: Pyöreät. Varpaat lyhyet, vahvat, hyvin kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Kovat ja paksut päkiät, lyhyet ja vahvat kynnet.

TAKARAAJAT:

Yleisvaikutelma: Leveät, vahvat ja lihaksikkaat. Takaa katsottuna raajat kintereestä käpälään suorat ja yhdensuuntaiset, eivät liian lähekkäin eivätkä liian kaukana toisistaan.

Reidet: Pitkät, vahvat ja hyvin kehittyneet.

Polvet: Hyvin kulmautuneet.

Kintereet: Vahvat ja matalat.

Takakäpälät: Pyöreät. Varpaat lyhyet, vahvat, hyvin kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Kovat ja paksut päkiät, lyhyet ja vahvat kynnet.

LIIKKEET: Tasapainoiset, vapaat, joustavat ja väsymättömät. Lapojen ja eturaajojen liike sopusoinnussa takaraajojen voimakkaan työnnön kanssa. Olennaista on koiran kyky nopeisiin ja äkillisiin käännöksiin. Liikkeet ovat kaikin puolin terveet. Ravissa raajoilla on taipumus lähetä toisiaan vauhdin lisääntyessä, mutta koiran seistessä sen raajat asettuvat tukevasti rungon kulmiin.

KARVAPEITE:

Karva: Sileä ja kaksinkertainen. Aluskarva lyhyt ja tiheä. Päälyskarva tiivis, jokainen karva suora, kova ja rungonmyötäinen siten, että turkki on säänkestävä. Rungon alta reisien takaosaan karvapeite on pitempää ja muodostaa reidessä vähäiset "housut". Päässä, korvien sisäpuolella, raajojen etuosassa ja käpälissä karva on lyhyttä. Kaulassa karva on pitempää ja paksumpaa. Liian pitkä tai lyhyt karvapeite on virheellinen. Turkin pituus rungossa keskimäärin 2,5–4 cm.

Väri:

Sininen: Sininen tai sinikirjava (blue mottled tai blue speckled), joko merkkien kanssa tai ilman merkkejä. Sallittuja ovat mustat, siniset tai tan-merkit päässä, mieluummin symmetrisesti sijoittuneina molemmin puolin päätä. Eturaajoissa tanväriä raajan puoliväliin ja ylös rintaan, kaulaan ja leukaan. Takaraajojen sisäpinnat, polvien etupuolet, kintereet ja varpaat tan-väriset. Tan-värinen aluskarva rungossa sallittu edellyttäen, että se ei näy sinisen päälyskarvan läpi. Mustat merkit rungossa eivät toivottavia.

Punainen: Kauttaaltaan punakirjava (red speckle), myös aluskarva (ei valkoinen eikä kermanvärinen).
Päässä voi olla tummemmanpunaisia merkkejä, mieluiten symmetrisesti sijoittuneina. Punaiset merkit rungossa sallittuja mutta eivät toivottuja.

KOKO

Säkäkorkeus: Urokset 46–51 cm, nartut 43–48 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.

VAKAVAT VIRHEET:

- Raskaat, löysät tai pystyt lavat
- Heikot kyynärpäät, välikämmenet tai käpälät
- Puutteellinen polvikulma
- Pihtikinttuisuus, länkisäärisyys
- Jäykät liikkeet

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

- Vihaisuus tai liiallinen arkuus
- Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivistä täysin laskeutuneina kivespussiin.

Rodun koirien näyttelykäynnit

Taulukko 38 RODUN NÄYTTELYKÄYNNIT 2010-2015

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
ERI	154	218	218	220	204	183
EH	29	65	55	54	56	87
H	14	5	15	15	13	13
T	0	0	1	2	1	0
EVA	1	1	2	3	0	1
HYL	0	1	0	4	1	2
YHTEENSÄ	198	290	291	298	275	286

Rodun näyttelykäyntien määrä on pysynyt melko tasaisena, hiukan alle 300 käynnin tuntumassa. Vuoden 2015 kaikkia näyttelyitä ei vielä ole tilastoitu (30.11.2015).

Kansainvälisen muotovalion arvon on saavuttanut 66 koiraa, ja 158 koiraa on saavuttanut Suomen muotovalion arvon.

4.5.2. Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus

Rodun rotumääritelmä on selkeä, ja tukee rodun alkuperäistä käyttötarkoitusta. Rotu ei ole eriytynyt erillisiin näyttely- tai käyttölinjoihin ja etenkin Suomessa näyttelyissä pärjäävät koirat ovat rakenteeltaan erittäin hyviä, kooltaan ja voimakkuudeltaan sopusuhtaisia koiria, joilla ei ole liioiteltuja piirteitä.

Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus kestäväenä, ketteränä ja vahvana paimenkoirana tulee olla ulkomuotoa jalostaessa mielessä. Rodulle ei tule jalostuksellisesti hakea näyttävyyttä käyttämällä jalostukseen mahdollisimman suuria tai raskaita koiria. Suomalaiset kasvattajat vaalivat hyvää rakennetta ja sopusuhtaista ja toiminnallista australiankarjakoira. Ulkomailla näyttelyihin tähtäävä jalostus on saanut aikaan myös ylilyöntejä, joissa esimerkiksi karjakoiran päästä pyritään saamaan mahdollisimman raskas tai tyypitetty, ja koirista toivotaan suuria ja raskaita. Samalla oikeiden mittasuhteiden, kulmausten tai hyvän liikkumisen suhteen tehdään kompromisseja.

4.5.3. Keskeisimmät ongelmakohdat

Australiankarjakoiran ulkomuodossa ei ole merkittäviä keskeisiä ongelma-kohtia, ja rotumääritelmän mukaiset koirat ovat rakenteeltaan terveitä, hyvin liikkuvia, sopusuhteisesti kulmautuneita ja hyväkuntoisia. Suomalaisten koirien koko vastaa hyvin rotumääritelmää ja kasvattajat ovat hyvin tietoisia rotumääritelmästä. Näyttelyssä käyvien koirien yleisin arvosana on erinomainen, mikä kertoo koirien hyvästä tasosta. Suomalaiset kasvattajat eivät tavoittele jalostustyössään äärimmäisen tyyppitettyjä koiria joilla olisi liioiteltuja piirteitä. Mahdollisia tulevia ongelma-kohtia tai rodun ulkonäöllisiä muoti-ilmiöitä pyritään ennaltaehkäisemään tuomarien kouluttautumisella ja tekemällä yhteistyä esimerkiksi tuomarikoulutusten järjestämisessä yhdessä Palveluskoiraliiton kanssa.

5. YHTEENVETO Aiemman Jalostuksen Tavoiteohjelman Toteutumisesta

Rodun edellisen jalostuksen tavoiteohjelman voimassaolokausi

Rodun edellinen jalostuksen tavoiteohjelma oli voimassa 2007-2011, ja sen päivitys vuosille 2012-2016 hyväksyttiin 9.11.2011 SKL:n jalostustieteellisessä toimikunnassa.

Taulukko 39 EDELLISEEN TAVOITEOHJELMAAN KIRJATUT JALOSTUSTAVOITTEET SEKÄ NIIDEN TOTEUTUMINEN

TAVOITE	TOIMENPIDE	TULOS
DLA, PRA-dna ja BAER-listan ylläpitäminen	Jalostustoimikunnan johdolla julkaistaan jäsenistön luovuttamia tietoja niistä sairauksista, joita ei näy jalostustietokannassa.	Lista muutettu terveystietokannaksi, joka palvelee entistä monipuolisemmin kasvattajia ja harrastajia
Yhdistyksen järjestämä luonnetestaus	Luonnetestien järjestäminen säännöllisesti	Yhdistyksen järjestämiin luonnetesteihin on osallistunut useita koiria, mikä tuonut lisätietoa rodun luonteista tänä päivänä.
Monipuolisen ja informatiivisen Karjis-lehden ylläpito	Monipuolisten artikkeleiden ja yhdistysten kokoamien tietojen julkaisu.	Lehden toiminta jatkuu, luonnetesti- ja mh-kuvaustilastoja ja mm. teetettyjen kyselyiden tulokset julkaistu lehdessä.
Luonteiden seuranta	Luonnetestitulosten ylläpito.	Kerätty ja julkaistu kaikkien luonnetestissa käyneiden koirien tulokset ja käytetty tuloksia hyödyksi mm. JTO:n teossa.
Selkäsairauksien kartoittamiseen kannustaminen	Informointi karjislehden kautta eri selkäsairauksista.	Selkätutkimukset virallistuneet ja yleistyneet rodulla edellisen JTO:n jälkeen.
Jalostustoimikunnan asiantuntijajäsenen konsultointi	Tarvittaessa	Jalostustoimikunnan asiantuntijajäsen Elena Ruskovaara arvostellut rodun erikoisnäyttelyn 2013.
Kasvattajien yhteistyöhön kannustaminen	Hyvän keskustelemaan ilmapiiriin ylläpito rodun virallisilla nettipalstoilla (entisellä foorumilla, nykyisessä facebook –ryhmässä)	Kasvattajat toimineet erinomaisessa yhteistyössä rodun selkälausuntojen virallistamista haettaessa ja vastanneet aktiivisesti lisääntymiskyselyyn.
Paimennusominaisuuksien kartoittaminen	Paimennuspäivien järjestäminen	Paimennuspäiviin osallistunut useita australiankarjakoiria.
Jäsenistön, hallituksen ja jalostustoimikunnan kouluttaminen	Tiedottaminen tulevista koulutuksista ja niihin osallistumisen mahdollistaminen	Erilaisiin koulutuksiin osallistumisesta tuotu tietoa jäsenistölle mm. karjislehden välityksellä.

Jalostuksen ulkopuolelle jäävien koirien osuus

Jalostuksen ulkopuolelle jää suuri määrä koiria. Rodussa pentueita syntyy vuodessa hyvin vähän, eikä syntyviä sukupolvia saada tehokkaasti jalostuskäyttöön.

Jalostussuositusten ja PEVISAn ajantasaisuuden arviointi

Suomen australiankarjakoirat ry:n jalostustoimikunta on päivittänyt jalostussuositukset vuonna 2015, joten ne on muutettu ajantasaisiksi.

Jalostustoimikunta ja hallitus ovat yksimielisiä siitä, että rodun PEVISA-ohjelma ei vastaa viimeisen viiden vuoden aikana esilletulleisiin terveydellisiin haasteisiin rodussa. Hallitus ja jalostustoimikunta esittivät PEVISA-ehdotuksensa vuosikokoukselle 2016. PEVISA-ohjelmaan halutaan sisällyttää merkittävien jalostuskoirien (enemmän kuin yksi pentue) selkätutkimusvaatimus spondyloosin osalta. Tarkoituksena on estää spondyloosin leviäminen kannassa ja parantaa rodun selkien terveyttä pitkällä aikavälillä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 6.3.2016.

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

6.1 Jalostuksen tavoitteet

Jalostuspohja

Ylläpitää mahdollisen monipuolista jalostuspohjaa, käyttää mahdollisimman kattavasti eri koiria jalostukseen ja pyrkiä käyttämään monipuolisesti myös tuontikoiria.

Käyttäytyminen ja luonne

Vaalia rodunomaista, tasapainoista, rohkeaa ja älykästä australiankarjakoira. Jalostuskoirien tulisi olla luonnetestattuja ja arkielämässä tasapainoisesti käyttäytyviä koiria.

Käyttöominaisuudet

Ylläpitää ja vaalia karjakoiran kykyä työskennellä niin paimen- kuin harrastuskoirina. Jalostuksen tavoitteena tulee sekä luonteen että rakenteen osalta olla monipuolisen työkoiran vaaliminen.

Terveys ja lisääntyminen

Jalostuksen tavoitteena tulee olla terve koira. Rodulla esiintyvien sairauksien leviämisen hallinta ja ilmenevien sairauksien määrän vähentäminen tulee olla tavoitteena. Jalostuskoirien terveydestä tulee olla kattavasti tietoa. Lisääntymisessä suurin haaste on keisarinleikkausten suuri määrä, eikä keisarinleikattua narttua tule käyttää uudestaan jalostukseen.

Ulkomuoto

Jalostuksen tavoitteena on ylläpitää rodunomaista ulkomuotoa, rakennetta ja liikettä. Jalostuksella ei tule pyrkiä muuttaa australiankarjakoiran ulkomuotoa millään muotoa liioitteluksi.

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille

Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista

Jalostukseen käytetyn australiankarjakoiran tulee olla luonteeltaan tasapainoinen, terve ja hyväkuntoinen, rotumääritelmän mukainen koira. Jalostuksessa tulee vaalia tervettä rakennetta, rodunomaista luonnetta ja työskentelykykyä sekä ottaa huomioon pienen populaation haasteet jalostuskumppania valitessa. Eri koiria tulisi käyttää jalostuksessa mahdollisimman paljon.

Jalostusyksilön tulisi täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset

- suoritettut PEVISA-tutkimukset
- virallinen spondyloositutkimus
- BAER-testattu molemmin puolin kuulevaksi
- koiralla on virallinen polvitutkimustulos ja sen polvet ovat terveet
- osoitus laukausvarmuudesta (palvelus- tai pelastuskoirakoetus, luonnetesti hyväksytty tulos laukausvarmuudesta tai mh-kuvauksessa ampumisessa reaktiot 1-3)
- näyttelystä laatuarvostelu erittäin hyvä

Jalostukseen ei tulisi käyttää koira

- joka ei täytä PEVISA-ehtoja
- jolla on arkielämää haittaavia terveydellisiä ongelmia tai luonneongelmia
- jolla on perinnölliseksi tiedettävä vakava sairaus (epilepsia, ncl, sydämen vajaatoiminta)
- jolla on spondyloosilauseunto 2 tai huonompi
- jolla on kehityshäiriöitä (synnynnäinen koukkuhäntä, ylä- tai alapurenta)
- jolla perinnöllinen silmätauti jonka periytyvyyttä ei geenitestauksella voi estää
- narttua, joka jouduttu keisarinleikkaamaan
- narttua, jolla on yli 20 jälkeläistä
- urosta, joka on haluton astumaan
- urosta, jolla on yli 20 jälkeläistä

Keskenään ei tulisi astuttaa

- jälkeläisiä isovanhempiensa, vanhempiensa tai näiden sisarusten kanssa eikä sisaruksia keskenään -> sukusiitosasteen tulisi olla pienempi kuin 6,25
- kahta spondyloositutkimatonta tai spondyloosisairasta koiraa
- kahta koiraa, jolla on hammaspuutoksia
- kahta luonnetestaamatonta tai luonnetestissä hylättyä koiraa

Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle

Suomen australiankarjakoirat ry:n jalostustoimikunnan suositus rodun maksimijälkeläismäärälle on 20 kappaletta. Populaation kannalta olisi erittäin tärkeää käyttää mahdollisimman monipuolisesti eri koiria eikä käyttää toistuvasti samoja koiria jalostukseen. 20 pentua olisi hyvä ajoittaa niin, että eri pentueiden välillä olisi mahdollisimman pitkä aika, jolloin koiran uusintakäyttöä pystytään harkitsemaan sen tuottamien pentujen perusteella sekä seurata kehittykö yksilölle joku sellainen sairaus tai vika, joka ei välttämättä ole havaittavissa nuorena. Uusintayhdistelmien tekoa tulee välttää.

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet

Australiankarjakoirien rotujärjestö on Suomen Palveluskoiraliitto. Rotujärjestö toimii neuvoa-antavana tahona rotua harrastavalle yhdistykselle. Yhteistyössä Palveluskoiraliiton kanssa pyritään tiedottamaan esimerkiksi tuomareita oikeanlaisesta australiankarjakoirasta esimerkiksi tuomarikoulutusten yhteydessä.

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin

Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja ongelmat

Rodun jalostuksen suurimmat uhat liittyvät pieneen geenipooliin ja maailmanlaajuisestikin yksipuoliseen jalostuskoirien käyttöön. Kannassa erilaisten resessiivisesti periytyvien sairauksien kantajien määrä voi nousta nopeastikin ja vaikeuttaa entisestään monipuolista jalostuskoirien käyttöä. Myös erilaisten autoimmuunisairauksien yleistyminen on vaarana, mikäli rodun sukusiitosaste nousee ja geenipooli kaventuu entisestään.

Suomen kannassa konkreettisimmat viime vuosina lisääntyneet terveydelliset uhat liittyvät rodussa esiintyvän spondyloosin suureen määrään ja sen leviämiseen kannassa. Australiankarjakoiran spondyloosin perinnöllisyydestä ei ole tarkkaa tietoa, mutta sitä esiintyy rodulla huomattavasti muita keskikokoisia paimenkoirarotuja yleisemmin.

Toinen kasvattajien kokemusten perusteella lisääntynyt ongelma on keisarinleikkausten yleistyminen. Lisääntymiskartoitusta tehtäessä useat kasvattajat toivat esiin että tämänkaltaisia ongelmia esiintyy nykyään enemmän.

Suurimmat haasteet pienellä rodulla liittyvät siihen, että jalostuksella pystyttäisi hallitsemaan olemassa olevien ongelmien esiintyvyyttä ja ennaltaehkäistä uusien ongelmien syntyä.

Varautuminen ongelmiin

Tärkein keino varautua ongelmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn ovat vastuulliset kasvattajat, jotka tutkivat käyttämänsä koirat ja ovat rehellisiä linjoissaan ja jalostuskoirissaan ilmenevistä terveysongelmista. Hyvä yhteistyö suomalaisten australiankarjakoirakasvattajien ja rotua harrastavan yhdistyksen kanssa on tärkeää.

Tiedottaminen, tutkiminen ja avoimuus ovat tärkeimpiä työkaluja rodun hyvinvoinnin ylläpitoon.

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta

Taulukko 40 TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITEOHJELMAN SEURANTA

Vuosi	Tehtävä tai projekti
Jatkuva	Ajankohtaisista terveys- ja luonneasioista jäsenistön tiedottaminen
Jatkuva	Terveyslistan ylläpito
Jatkuva	Luonnetestitulosten ja mh-kuvaustulosten kerääminen
2017-2018	Käyttäytymiskyselyn luonti ja tuottaminen
2020	Lisääntymiskyselyn seuranta

JTO:n ja PEVISAn vaikutuksen seuraaminen

Jalostustoimikunta kerää tietoa suomalaisesta australiankarjakoirakannasta ja esittää hallitukselle tarvittaessa muutoksia esimerkiksi PEVISA-ohjelmaan havaintojen perusteella. JTO:n tarkoitus on koota tietoa kasvattajille rodun tämänhetkisestä tilasta ja nostaa esiin huomioitavia asioita jalostuksellisesti. JTO:ssa esitettyjä huolenaiheita seurataan ja niistä tiedottamista jäsenistölle jatketaan.

JTO:n teossa pyritään jatkossakin tekemään yhteistyötä kasvattajien kanssa lisääntymiskyselyn kaltaisten kyselyjen ja kartoitusten muodossa.

7. LÄHTEET

YLEISET LÄHTEET

Koiranet-jalostustietokanta

Australiankarakoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2007-2011

Australiankarakoiran rotumääritelmä

http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/attachments/rotumaaritelmat/fci_1/1australiankarakoira.pdf

RODUN TAUSTA

Australian National Kennel Council, Extended Breed Standard 2009,

http://ankc.org.au/media/pdf/635576344152806822_674410ad-df4c-424f-ab70-d0bf26dadb3.pdf

Branson, K., The History of the Australian Cattle Dog, 2015, internetsivu, viitattu 6/2015

<http://www.cattledog.com/misc/history.html>

Hammond – Robertson., N., History of the Breed, 2015, internetsivu, viitattu 6/2015

http://kombinalong.com/home/index.php/nggallery/page/1?page_id=23

Walsh, G. P., Kaleski, Robert Lucian Stanislaus (1877–1961), Australian Dictionary of Biography, National Centre of Biography, Australian National University, internetsivu, viitattu 12/2015, <http://adb.anu.edu.au/biography/kaleski-robert-lucian-stanislaus-6894/text11953>

JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA

Suomen australiankarakoirat ry, Yhdistys, internetsivu, viitattu 7/2014 <http://www.sakkry.com/yhdistys>

Suomen australiankarakoirat ry, Jalostustoimikunnan periaate, viitattu 6/2015

<http://www.sakkry.com/jalostus/jalostustoimikunnan-periaate>

RODUN NYKYTILANNE

POPULAATION RAKENNE JA JALOSTUSPOHJA

American Kennel Club, Registration, frequently asked questions, 2015, internetsivu, viitattu 12/2015

https://www.apps.akc.org/apps/contact/answer_center/faq_dogreg.cfm

American Kennel Club, Communications Department, rekisteröintitiedot luovutettu JTO-työryhmälle sähköpostitse 5/2014.

Australian National Kennel Council, National Breeder & Litter Statistics 2014 - A Forensic View of Puppy Breeding in Australia, 2015, internetsivu, viitattu 8/2015 <http://ankc.org.au/media/1206/a-forensic-view-of-puppy-breeding-in-australiav3.pdf>

Australian National Kennel Council, National Registration Statistics, 2015, internetsivu, viitattu 8/2015

http://ankc.org.au/media/4404/rego-stats-list_to-14.pdf

Australian Cattle Dog Club Deutschland, rekisteröinnit 2003-2013, internetsivu, viitattu 5/2014, <http://www.acdcd.de/> (huom! Sivut uudistuneet 2015, rekisteröintitietoja ei enää löydy uusilta sivuilta)

Mohammad R. Shariflou, John W. James, Frank W. Nicholas, Claire M. Wade, A genealogical survey of Australian registered dog breeds Faculty of Veterinary Science, University of Sydney, NSW 2006, Australia, internetjulkaisu, viitattu 3/2015

http://www.border-wars.com/wp-content/uploads/uexc_attach/genealogical_survey_australian_tollers_claire_wade.pdf

Mäki, K., Perinnöllinen monimuotoisuus ja jalostuspohja, Kennelliitto 2013, internetsivu, viitattu 5/2015
<http://www.kennelliitto.fi/perinnollinen-monimuotoisuus-ja-jalostuspohja>

Mäki, K., Sukusiitos, Kennelliitto 2013, internetsivu, viitattu 5/2015, <http://www.kennelliitto.fi/sukusiitos>

Mäki, K., Tehollinen populaatiokoko, Kennelliitto 2013, internetsivu, viitattu 5/2015 <http://www.kennelliitto.fi/tehollinen-populaatiokoko>

The Kennel Club, Population analysis of the Australian Cattle Dog Breed, 2015, internetjulkaisu, viitattu 5/2015
http://www.thekennelclub.org.uk/media/685383/australian_cattle_dog.pdf

LUONNETESTI, MH-KUVAUS JA AUSTRALIANKARJAKOIRAN KÄYTTÖ- JA KOEOMINAISUUDET

Kennelliitto, MH-luonnekuvaus, 2015, internetsivu, viitattu 4/2015
<http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/kokeet-ja-kilpailut/mh-luonnekuvaus>

Kennelliitto, Luonnetesti, 2015, internetsivu, viitattu 4/2015
<http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/kokeet-ja-kilpailut/luonnetesti>

Kennelliitto, Tottelevaisuuskoe, 2015, internetsivu, viitattu 4/2015,
<http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/kokeet-ja-kilpailut/tottelevaisuuskoe>

Kirjavainen, K., Suomen Noutajakoirajärjestö, Vesipelastus (VEPE), 2015, internetsivu, viitattu 4/2015
http://www.snj.fi/harrastukset/vesipelastus_vepe/

Koiramme-lehti, Luonnetestitiedote, Suomen Kennelliitto 4/2007

Rallytokoyhdistys, Rally-tokovalio ja rally-tokomestari, 2015, internetsivu, viitattu 9/2015
<http://www.rally-toko.fi/sivusto/index/tiedotteet/rally-tokovalio-ja-rally-tokomestari.html>

Suomen agilityliitto, Agilityurheilu, 2015, internetsivu, viitattu 6/2015, <http://www.agilityliitto.fi/agility-lajina/>

Suomen australiankarjakoirat ry, luonnetestatut australiankarjakoirat ja luonnetestiprofiili, internetsivu viitattu 9/2015,
<http://www.sakkry.com/rotutietoa/rakenne-ja-luonne>

Svenska Australian Cattle Dog Klubben, MH-Statistik 2007-2014,
<http://www.acdklubben.se/Homepage/Download-File/f/567597/h/7c09fb1ff420c2daa05a5dbc16c2b75c/MH+07%2B14>

Suomen Palveluskoiraliitto, Harrastuksena palveluskoira, 2015, internetsivu, viitattu 9/2015,
<http://www.palveluskoiraliitto.fi/koelajit/palveluskoiratoiminta.html>

Suomen Palveluskoiraliitto, Käyttätymiskoe, koulutustunnus (BH), 2015, internetsivu, viitattu 9/2015,
<http://www.palveluskoiraliitto.fi/koelajit/palveluskoiratoiminta/palveluskoirakoelajit/kayttaytymiskoe-bh>

Suomen Palveluskoiraliitto ry: Palveluskoirakokeiden säännöt ja lajiohjeet, SPKL, 2008, 3. Painos

Suomen Palveluskoiraliitto, Pelastuskoira, 2015, internetsivu, viitattu 9/2015,
<http://www.palveluskoiraliitto.fi/pelastuskoiratoiminta.html>

Välitalo, J., Suomen Noutajakoirajärjestö, Metsästyskoirien jäljestämiskoe (MEJÄ), 2015, internetsivu, viitattu 4/2015
http://www.snj.fi/harrastukset/metsastyskoirien_jaljestamiskoe/

TERVEYS JA LISÄÄNTYMINEN

Eskelinen, E., Koiran polven ristisiteen repeämä, 2013, Animagi Oy, internetsivu, viitattu 11/2015
<http://www.animagi.fi/koiran-polven-ristisiteen-repeama>

Lappalainen, A., Kynänivelen kasvuhäiriöt, Kennelliitto 2010, internetsivu, viitattu 10/2015
<http://www.kennelliitto.fi/kynarnivelen-kasvuhairiot>

Lappalainen, A., Lonkkanivelen kasvuhäiriö, Kennelliitto 2013, internetsivu, viitattu 10/2015, <http://www.kennelliitto.fi/lonkkanivelen-kasvuhairio>

Menna, N., Koiran epilepsia, Kennelliitto 2015, viitattu 10/2015, <http://www.kennelliitto.fi/koiran-epilepsia>

Mäki, K. Hielm-Björkman, A. Tunnistatko koirasi kivun, Kennelliitto 2015, viitattu 12/2015 <http://www.kennelliitto.fi/tunnistatko-koirasi-kivun>

Sainio, K., Kuurouden taustaa koirilla, Kennelliitto 2015, viitattu 10/2015, <http://www.kennelliitto.fi/kuurouden-taustaa-koirilla>

Saikk-Bäckström, A., Lappalainen, A., Perinnölliset selkämuutokset, Kennelliitto 2015, viitattu 7/2015 <http://www.kennelliitto.fi/perinnolliset-selkamuutokset>

Sommerland, SF., Morton, JM., Haile-Mariam, M., Johnstone, I., Seddon, JM., O'Leary, CA., Prevalence of congenital hereditary sensorineural deafness in Australian Cattle Dogs and associations with coat characteristics and sex, The University of Queensland, 2012, internetjulkaisu, viitattu 1/2015 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23107143>

Suomen australiankarjakoirat ry, Terveyslista, viitattu 11/2015, <http://sites.really.fi/userData/suomen-australiankarjakoirat-ry/terveyslista.pdf>

Suomen australiankarjakoirat ry, NCL-tiedote , viitattu 11/2015 http://sites.really.fi/userData/suomen-australiankarjakoirat-ry/ncl_tiedote11.pdf

Vanhapelto, P., Lappalainen A., Yleisimmät perinnölliset silmäsairaudet, Kennelliitto 2015, internetsivu, viitattu 8/2015, <http://www.kennelliitto.fi/yleisimmat-perinnolliset-silmasairaudet>

ULKOMUOTO

Suomen Kennelliitto, Koiranäyttelysäännöt 1.1.2012-31.12.2016, 2011, internetjulkaisu, <http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/koiranayttelysaannot2012.pdf>

8. LIITTEET

Liite 1.

Lisääntymiskartoitus 2009-2014

Yhdistyksen kasvattajille lähetettiin keväällä 2014 lisääntymiskysely jonka tarkoituksena oli selvittää suomalaisten australiankarjakoirien lisääntymiseen liittyviä ominaisuuksia ja mahdollisia ongelmakohtia. Uudessa jalostuksen tavoiteohjelmassa pyydetään kaikilta roduilta rodun luonnollisen lisääntymisen tarkastelua ja lisääntymiskartoituksessa kerättyjä tietoja käytetään jalostuksen tavoiteohjelmaa tehdessä lähteenä.

Lisääntymiskartoituksessa kasvattajilta kysyttiin pentueiden syntymästä, astutustapahtumista, suunniteltujen pentueiden onnistumisista ja epäonnistumisista ja niiden syistä. Lisäksi kartoitettiin pentujen elinvoimaisuutta ja emänominaisuuksia. Aikaväliksi kartoitusta varten valikoitui aikaväli 2009-2014, koska tänä aikana on syntynyt suurin osa seuraavan jalostuksen tavoiteohjelman aikana lisääntyvistä tai parhaillaan lisääntymisissä olevista koirista.


Aikavälillä tammikuu 2009 ja elokuu 2014 syntyneitä, Suomessa rekisteröityjä australiankarjakoirapentueita oli yhteensä 40, pitäen sisällään 159 syntynyttä ja rekisteröityä pentua. Lisääntymiskyselyyn vastattiin 37 pentueesta, 149 rekisteröidyn pennun osalta. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 92,5% ja tätä voidaan pitää hyvänä otantana tämän aikavälin pentueisiin. Vastausaktiivisuudesta päätellen lisääntymiskysely ja siitä saatava tieto nähtiin tärkeänä.

Lisääntymiskyselyssä ei kysytty pentueiden vanhempien tietoja ja kyselyyn oli mahdollista vastata nimettömänä. Kasvattajakohtaisista tietoja ei myöskään kerätty talteen jalostustoimikunnan toimesta.

PENTUEET

Kyselyssä käytiin läpi syntyneiden pentueiden määrä, sekä niiden suunniteltujen pentueiden määrä, jotka eivät yrityksestä huolimatta ole toteutuneet. Suurin osa (84%) suunnitelluista australiankarjakoirapentueista toteutuu, ja tiinehtymiseen liittyvät ongelmat eivät näyttäyty kartoituksen valossa merkittävältä uhkatekijältä.

	PENTUEMÄÄRÄT 2009-2014	Määrä:
1.	Syntyneiden pentueiden määrä	37
2.	Niiden suunniteltujen pentueiden määrä, jotka eivät ole toteutuneet: a) Koska astutus/siemennys ei ole onnistunut b) Astutus/siemennys on onnistunut, mutta narttu ei ole tiinehtynyt c) Nartun tiineys on todettu, mutta on mennyt kesken/narttu on synnyttänyt vain kuolleita/elinkelvottomia pentuja	Määrä: 3 3 1
3.	Pentueet joista ei vastattu kyselyyn	3




ASTUTUSTILANTEET

Luonnollisen lisääntymisen yksi suurimpia kulmakiviä on luonnollinen astumistapahtuma, jossa uros on halukas astumaan nartun ja narttu antaa uroksen astua itsensä. Keinosiemennyksen käyttö mahdollistaa geenipoolin kannalta tärkeän ulkomaisten urosten käytön, eikä sitä tule karsastaa. Keinosiemennykset eivät ole tällä hetkellä kovin yleisiä australiankarjakoirilla. Keinosiemennyksen käyttö on rajoittunut yksinomaan ulkomaisten urosten käyttöön, eikä keinosiemennystä ole tarvittu käyttää uroksen tai nartun lisääntymishaluttomuuden takia.

	ASTUTUSTILANTEET 2009-2014	Määrä:
1.	Normaaleista astutuksista syntyneiden pentueiden määrä:	35
2.	Keinosiemennyksellä syntyneiden pentueiden määrä	2

3.	Keinosiemennyksen syyt:	Määrä:
	a) Ulkomaisen sperman käyttö:	2
	b) Narttu ei anna uroksen astua	0
	c) Uros ei astu narttua	0
	d) Muu syy: kirjoita syy tähän	0



SYNNYTYKSET

Onnistunut tiinehtyminen johtaa synnytykseen. Sikiöiden erittämät hormonit yhdessä nartun hormonitoimintaan käynnistävät synnytyksen. Estrogeeni-, oksitosiini- ja relaksaanihormonit säätelevät synnytystä ja supistuksia.

Synnytysvaikeuksia esiintyy jokaisella rodulla, mutta niiden määrä vaihtelee n. 5% aina lähes 100% asti. Synnytysvaikeukset ovat yleisempiä pentuemäärältä poikkeavien pentueiden kohdalla, hyvin pienet ja hyvin suuret pentueet voivat siis lisätä synnytysvaikeuksien määrää. Lisäksi ensikertalaisilla on yleensä enemmän synnytysvaikeuksia kuin seuraavien pentueitaan synnyttävillä. Lisääntymiskartoituksessa ei kysytty synnytysongelmien suhteen sitä, oliko narttu ensikertalainen vai ei.

Australiankarjakoirilla keskimääräinen pentuekoko vuosina 2009-2014 oli 4,1 pentua. Pentuekoot ovat lievässä laskussa. Vuosina 2000-2008 keskimääräinen pentukoko oli 4,4 pentua. Pienessä rodussa, jossa pentuemäärät ovat vuosittain pienet, yksittäiset pienet pentueet laskevat keskiarvoa ja vaikuttavat tilastoihin voimakkaasti. Pentumäärien kehitystä on kuitenkin hyvä seurata.



Yleisesti suurin osa synnytysongelmista ovat lähtöisin nartusta. Yleisimpänä syynä synnytysvaikeuksiin pidetään polttoheikkoutta, eli kohdun supistusten heikkenemistä, niiden puuttumista tai niiden loppumista kesken synnytyksen. Supistuksia voidaan koettaa vahvistaa oksitosiinipistoksella, mutta mikäli oksitosiinista ei ole apua, joudutaan usein turvautumaan keisarinleikkaukseen. Myös nartun synnytyselimissä voi esiintyä rakenteellisia vikoja, jotka estävät luonnollisen synnytyksen. Nämä ovat harvinaisempia syitä keisarinleikkaukseen.

Australiankarjakoirien luonnollisten synnytysten määrä, joissa narttu ei ole tarvinnut eläinlääkinnällistä apua, on 62% syntyneistä pennuista. Tämä tarkoittaa sitä, että jonkinasteisia synnytysvaikeuksia tavataan 38%:lla syntyneistä pentueista. 32% vuosina 2009-2014 syntyneistä pentueista on syntynyt keisarinleikkauksella. Australiankarjakoiria on normaalirakenteinen ja keskikokoinen rotu, jolla ei ole liioiteltuja piirteitä kuten esimerkiksi isopäisillä bull-tyyppisillä roduilla, ja siksi keisarinleikkausten määrää voidaan pitää huolestuttavan suurena.

Nartusta johtuvat syyt keisarinleikkaukselle muodostavat australiankarjakoirilla 50% keisarinleikatuista pentueista ja polttoheikkous on suurin yksittäinen syy keisarinleikkaukselle. 42% keisarinleikkauksista voidaan ajatella johtuvan pennuista riippuvista syistä. Pennun suuri koko muodostaa neljäsosan (25%) keisarinleikkaukseen johtaneista syistä ja väärässä asennossa syntynyt pentu on syynä 17 prosenttiin keisarinleikkauksista. 8% kohdalla syy keisarinleikkaukseen ei ole selvillä tai sitä ei ole kerrottu. Pennun suuri koko voi olla seurausta pienestä pentueesta, jolloin yksittäiset pennut pääsevät kasvamaan turhan suuriksi.

Taipumusta polttoheikkouteen pidetään periytyvänä ominaisuutena, joten on odotettavissa, että myös jatkossa sitä tulee australiankarjakoirilla esiintymään. Nykyisessä jalostuksen tavoiteohjelmassa suositellaan, ettei keisarinleikattua narttua tulisi käyttää uudelleen jalostukseen. Etenkin polttoheikkouden takia keisarinleikkaukseen joutuneiden narttujen kohdalla jalostuskäyttöä tulee harkita vakavasti, mikäli polttoheikkoudesta johtuvien keisarinleikkauksien määrää halutaan rodussa vähentää. Vaikka suurin osa keisarinleikkauksista sujuu ongelmitta ja nartut toipuvat niistä hyvin, on leikkaus aina riski sekä nartulle että pennuille ja nartun palautuminen synnytyksestä on keisarinleikkauksen jälkeen hitaampaa. Keisarinleikatut nartut tarvitsevat myös muita useammin apua pentujen hoidossa ja saattavat pahimmassa tapauksessa hylkiä pentujaan tai jopa yrittää vahingoittaa niitä.


	SYNNYTYKSET VUOSINA 2009-2014	Määrä:
1.	Narttu synnyttänyt luonnollisesti ilman erityisiä aputoimenpiteitä:	23
2.	Narttu on tarvinnut synnytysvaikeuksien takia eläinlääkinnällistä apua tai eläinlääkärikäynnin (ei keisarinleikkauksia tähän kohtaan):	2
3.	Nartulle on jouduttu tekemään keisarinleikkaus:	12
4.	Keisarinleikkauksen syyt: f) Polttoheikkous, eli kohdun supistusten puuttuminen: g) Väärässä asennossa syntyvä pentu: h) Pennun suuri koko: i) Nartun synnytyselinten rakenteellinen vika: j) Muu syy: kirjoita syy tähän	Määrä: 5 2 3 1 1
5.	Narttu on kuollut synnytykseen tai sen jälkeisiin komplikaatioihin:	0



Pentujen elinvoimaisuus ja pentukuolleisuus mittaa myös koirien lisääntymisominaisuuksia ja lisääntymiskykyä. Pentukuolleisuuden normaalia määrää on vaikea arvioida, eri lähteiden mukaan normaali pentukuolleisuuden määrä on n. 10-25% kaikista syntyneistä pennuista. Yhden tai kahden kuolleen pennun esiintymistä pentueessa ei pidetä epänormaalina. Mikäli kuolleita pentuja on tätä useampia pentuetta kohden, olisi pentukuolleisuuden syytä hyvä selvittää lähettämällä menehtyneet pennut avattavaksi Eviraan. Pentukuolleisuuden syitä on monia, aina tarttuvista taudeista erilaisiin kehityshäiriöihin ja epämuodostumiin. Pitkittynyt synnytys ja muut synnytysvaikeudet lisäävät pentukuolleisuuden riskiä.

Australiankarjakoirilla pentukuolleisuus on 13 %, joten pentukuolleisuuden määrä ei vaikuta huolestuttavalta. Synnytyksestä selvinneet pennut ovat elinvoimaisia ja ns. ”fading puppy” pentujen, jotka syntyvät heikkona ja kuolevat ensimmäisten vuorokausien aikana, määrä on vähäinen. Aikavälillä syntyneitä pentuja ei ole myöskään tarvinnut lopettaa vakavien epämuodostumien tai kehityshäiriöiden takia. Voidaan olettaa että lähes kaikilla elävänä syntyneillä pennuilla on hyvä mahdollisuus varttua aikuisuuteen.

	PENTUJEN ELINVOIMAISUUS VUOSINA 2009-2014	Määrä:
1.	Synnytyksessä kuolleiden, silmämääräisesti normaalien pentujen määrä:	21
2.	Ensimmäisen elinvuorokausien aikana kuolleiden, nk. ”fading puppy” –pentujen määrä:	1
3.	Epämuodostumien ja kehityshäiriöiden, kuten kitalakihalkioiden, vesipään yms. Syiden takia kuolleiden tai lopetettujen pentujen määrä:	0
4.	Terveenä syntyneiden, vahvojen pentujen määrä, jotka menehtyneet ennen kolmen kuukauden ikää (huom. Ei esimerkiksi kuurouden takia lopetetut tai onnettomuuksissa kuolleet):	Määrä:
5.	Menehtymisen syy:	
	a) Emä on vahingoittanut pentua	0
	b) Pentu on sairastunut tartuntatautiin	0
	c) Muu syy: kirjoita syy tähän	0
	d) Syy ei selvillä	0



Huom. Vuosina 2009-2014 rekisteröityjen pentujen määrä on 159.

Niiden kasvattajien, jotka kyselyyn vastasivat, syntyneiden pentujen määrä on yhteensä 149.


Luvut on laskettu kyselyyn vastanneiden kasvattajien pentueiden mukaan

EMÄN OMINAISUUDET

Yhtenä tekijänä vähäiseen pentukuolleisuuteen voidaan pitää emän ominaisuuksia ja kykyä huolehtia jälkikasvustaan. Suomalaisten australiankarjakoirien emän ominaisuudet vaikuttavat erinomaisilta, kaikissa kyselyyn vastatuista pentueista emien kerrotaan hoitaneen pentunsa hyvin. Kahden keisarinleikatun nartun kohdalla narttu on aluksi tarvinnut apua pentujen hoitoon, mutta on alun jälkeen hoitanut pentunsa ilman ongelmia. Tämän voidaan olettaa johtuvat keisarinleikkauksesta toipumisesta puuttellisten emän ominaisuuksien sijaan. Tämä on arvokas piirre rodun kannalta ja tärkeä osa luonnollista lisääntymistä.

	EMÄN OMINAISUUDET VUONNA 2009-2014	Määrä:
1.	Emä on hoitanut pentunsa hyvin ja ilman ongelmia:	35
2.	Emä on tarvinnut alussa apua pentujen hoidossa, mutta sitten hoitanut pennut hyvin. Emä on synnyttänyt:	Määrä:
	a) Luonnollisesti	0
	b) Keisarinleikkauksella	2
3.	Emä on tarvinnut läpi pentuajan apua pentujen hoitoon, ei oma-aloitteisesti puhdistaa tai hoivaa pentuja:	0

4.	Emä on hyljeksinyt pentujaan:	0
5.	Emä on käyttäytynyt aggressiivisesti pentujaan kohtaan:	0
6.	Emä on tappanut pentujaan:	0
7.	Emän ominaisuuksien takia pennut ovat tarvinneet keinoemon:	0



YHTEENVETO

Lisääntymiskyselyä voidaan pitää vastausaktiivisuuden perusteella onnistuneena. Lisäksi vastausten perusteella kasvattajat ovat halunneet kertoa rehellisesti myös pentueita kohdanneista ongelmista, erityisesti tiedot keisarinleikkausten määrästä ovat rodun kannalta arvokkaita.

Suomalaisten australiankarjakoirien kykyä luonnolliseen lisääntymiseen voidaan pitää kohtuullisen hyvänä, ja koirien sukupuolivietissä, tiinehtymisessä, pentukuolleisuudessa tai hoivavietissä ei näytä olevan puutteita. Pennut syntyvät elinvoimaisina ja emät hoitavat pentunsa ensiluokkaisesti. Ainoana luonnollista lisääntymistä uhkaavana tekijänä suomalaisilla australiankarjakoirilla voidaan pitää synnytysvaikeuksien suurta osuutta, ja etenkin polttoheikkouden runsasta esiintymistä. Lisäksi pentuekokoja on hyvä jatkossakin seurata, sillä pienet pentueet lisäävät synnytysvaikeuksien riskiä. Samankaltaista kyselyä olisi hyvä tehdä säännöllisin väliajoin, jotta sekä kasvattajat että yhdistys voisivat seurata lisääntymisominaisuuksien kehittymistä vuosien saatossa.

Jalostustoimikunta haluaa kiittää kaikkia aktiivisia kasvattajiamme kyselyyn vastaamisesta, ilman teitä näiden tietojen kerääminen ei olisi ollut mahdollista!

Suomen australiankarjakoirat ry

Jalostustoimikunnan puolesta,

Aino Kinnunen

Lähteet:

Lisääntymiskyselyn vastaukset vuosilta 2009-2014

Koiranet – jalostustietokanta, jalostustilastot 2000-2014

Menna, N. Koiran lisääntyminen, <http://www.spj.fi/binary/file/-/id/124/fid/622/>